

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)

Кафедра высшей математики

Ю.И. Дементьев, О.Г. Илларионова

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

Учебно-методическое пособие
по выполнению практических заданий

*для студентов II курса
направления 25.03.01 (ГСМ)
очной формы обучения*

Москва
ИД Академии Жуковского
2021

УДК 51
ББК 517
Д30

Рецензент:

Платонова И.В. – канд. экон. наук, доцент

Дементьев Ю.И.

Д30 Высшая математика [Текст] : учебно-методическое пособие по выполнению практических заданий / Ю.И. Дементьев, О.Г. Илларионова. – М.: ИД Академии Жуковского, 2021. – 48 с.

Данное учебно-методическое пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Высшая математика» по учебному плану для студентов второго курса направления 25.03.01 (ГСМ) очной формы обучения.

Учебно-методическое пособие охватывает разделы математики, изучаемые студентами по дисциплине «Высшая математика» на втором курсе: дифференциальные уравнения, числовые ряды, функциональные ряды, ряды Фурье, случайные события, дискретные и непрерывные случайные величины, основы математической статистики.

В учебно-методическом пособии содержатся варианты контрольных домашних заданий и справочные материалы.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 16.03.2021 г. и методического совета 18.03.2021 г.

УДК 51
ББК 517

В авторской редакции

Подписано в печать 26.10.2021 г.

Формат 60x84/16 Печ. л. 3 Усл. печ. л. 2,79

Заказ № 798/0616-УМП11 Тираж 40 экз.

Московский государственный технический университет ГА
125993, Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

Издательский дом Академии имени Н. Е. Жуковского
125167, Москва, 8-го Марта 4-я ул., д. 6А
Тел.: (495) 973-45-68
E-mail: zakaz@itsbook.ru

© Московский государственный технический
университет гражданской авиации, 2021

КОНТРОЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Задания 1 – 11, 16, 17, 20 имеют общую формулировку во всех вариантах.

Задания 1 – 5. Решить дифференциальные уравнения.

Задания 6 – 7. Исследовать сходимости знакоположительных рядов.

Задание 8. Исследовать сходимость ряда интегральным признаком сходимости.

Задание 9. Найти множество сходимости степенного ряда. На концах множества сходимости исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость.

Задание 10. Вычислить интеграл с точностью до 0,0001.

Задание 11. Разложить функцию в ряд Фурье на заданном интервале. Построить график функции и график суммы ряда Фурье.

Задание 16. Дан закон распределения дискретной случайной величины.

1. Найти вероятность p и построить многоугольник распределения.
2. Найти вероятности событий A , B и C .
3. Найти функцию распределения $F(x)$ и построить её график.
4. Вычислить $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

Задание 17. Непрерывная случайная величина X имеет функцию распределения $F(x)$.

1. Найти плотность распределения $f(x)$.
2. Построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.
3. Найти вероятность попадания случайной величины X в заданный отрезок.
4. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины X .

Задание 20. Дана выборка объёма n .

1. Варианты выборки разбить на k промежутков и найти соответствующие им частоты (границы интервалов можно „немного“ округлить и сдвинуть для упрощения расчётов).

2. Найти числовые характеристики выборки: выборочную среднюю, выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратическое отклонение, исправленную выборочную дисперсию.

3. Построить гистограмму относительных частот и выравнивающую кривую. Выдвинуть гипотезу о законе распределения.

4. Найти теоретические частоты.

5. При уровне значимости α проверить выдвинутую гипотезу по критерию χ^2 Пирсона.

Вариант 1.

1. $6x dx - 2y dy = 2y x^2 dy - 3xy^2 dx$ 2. $y' + y \operatorname{tg} x = \cos^2 x, y(\pi) = 0$

3. $(1 + x^2) y'' + 2x y' = 2x$ 4. $y''' + 8y'' + 15y' = 0$

5. $y'' + y' = 16x + 10, y(0) = 0, y'(0) = 0$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^3 n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n}$ 10. $\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ 11. $f(x) = x + 5, x \in (-2; 2)$

12. Найти вероятность того, что кость, наудачу извлечённая из полного набора домино, не содержит числа 5.

13. Студент знает ответ на 20 теоретических вопросов из 30 и сможет решить 30 задач из 50. Определить вероятность того, что студент полностью ответит на билет, который состоит из двух теоретических вопросов и трёх задач.

14. На складе имеется 20 телефонных аппаратов корейского производства и 30 — немецкого. В среднем, 5% корейских аппаратов и 2% немецких имеют брак. 1) Найти вероятность того, что случайно выбранный аппарат бракованный. 2) Случайно выбранный аппарат бракованный. С какой вероятностью этот аппарат был немецким?

15. Производятся последовательные испытания четырёх приборов на надёжность. Каждый следующий прибор испытывается только в том случае, если предыдущий оказался надёжным. Вероятность выдержать испытание для каждого прибора равна 0,9. Составьте таблицу распределения случайной величины X , равной числу испытанных приборов.

16.

x_i	-1	0	1	2	3
p_i	0,2	0,1	p	0,3	0,2

 $A = \{0 \leq X < 2\}; B = \{X \geq 1\}; C = \{X = 5\}.$

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{16}x^2 & \text{при } 0 \leq x < 2, \\ x - \frac{7}{4} & \text{при } 2 \leq x < \frac{11}{4}, \\ 1 & \text{при } x \geq \frac{11}{4}; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[1; \frac{5}{2}\right]$$

18. Ошибка измерения дальности подчинена нормальному закону с систематической ошибкой 20 метров и средним квадратическим отклонением 60 метров. Найти вероятность того, что измеренное значение дальности будет

отклоняться от истинного: а) не более, чем на 30 метров; б) более, чем на 100 метров.

19. Известно, что время работы прибора до его выхода из строя есть случайная величина T , распределённая по показательному закону. Среднее время работы прибора составляет две недели. Найти дисперсию, среднее квадратическое отклонение случайной величины T и вероятность того, что прибор проработает менее 10 дней.

20. $n = 80$, $k = 10$, $\alpha = 0,05$.

−15.72, −6.88, 20.05, −18.54, 26.44, 16.52, 4.43, 8.93, −8.14, 2.94, 28.15, 7.34, 6.06, −8.42, 4.44, 11.20, 13.96, −0.22, −1.63, 29.40, −18.11, 24.26, 25.66, 19.81, −15.06, −6.91, −3.23, 13.99, −13.17, 16.06, −14.66, 12.69, 4.71, 18.95, 15.75, 25.19, 24.55, −3.29, 14.94, −10.11, −18.47, 17.20, 5.00, 4.00, 25.24, 10.49, 10.88, 22.97, 20.27, 8.84, −10.85, −8.00, 24.33, −18.57, 4.50, −11.60, 28.93, 15.63, 5.02, 3.55, −17.02, 14.10, −17.88, −16.43, 6.08, −15.16, 20.91, 20.88, 16.12, −12.51, 12.98, 5.93, 28.65, 12.45, 20.02, 2.69, 1.62, 21.27, −15.83, −13.34

Вариант 2.

1. $y' \sin x = y \ln y$

2. $y' + y \operatorname{ctg} x = \cos x$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$

3. $2xy'y'' = (y')^2 - 1$

4. $y''' + 25y' = 0$

5. $y'' - 3y' + 2y = 10 \sin x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+5}\right)^n$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n (x-3)^n$

10. $\int_0^1 \cos x^2 dx$

11. $f(x) = |x| + 1$, $x \in (-\pi; \pi)$

12. В коробке лежат девять карточек, на которых написаны цифры от 1 до 9. Последовательно вынимают две карточки и кладут их рядом — получают двузначное число. Например, вынуты карточки с числами 1 и 3 — получили число 13, вынуты карточки с числами 3 и 1 — получили число 31. Найти вероятность, что полученное число является полным квадратом.

13. Из 20 деталей, среди которых 8 высшего качества, случайным образом выбирают на сборку 5. Какова вероятность того, что среди них окажется ровно 3 детали высшего качества?

14. Упаковка сосисок производится двумя автоматами с одинаковой производительностью. Доля брака, допускаемого первым автоматом, равна 5%, а вторым автоматом — 7%. 1) Найти вероятность того, что наудачу взятая упа-

ковка окажется бракованной. 2) Наудачу взятая упаковка оказалась бракованной. С какой вероятностью эта упаковка произведена первым автоматом?

15. Производится четыре независимых опыта Бернулли, причём вероятность успеха в каждом опыте равна 0,6. Случайная величина X — число успехов в четырёх опытах. Составьте закон распределения случайной величины X .

16.

x_i	-2	-1	1	3	4
p_i	0,3	0,1	0,2	p	0,1

 $A = \{X \leq 1\}; B = \{X = 2\}; C = \{-1 \leq X < 3\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{4}x & \text{при } 0 \leq x < 2, \\ \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 & \text{при } 2 \leq x < 4, \\ 1 & \text{при } x \geq 4; \end{cases} \quad \text{отрезок } [1; 3]$$

18. Завод изготавливает шарики для подшипников. Номинальный диаметр шариков равен 5 мм. Вследствие неточности изготовления шарика фактический его диаметр есть случайная величина, распределенная по нормальному закону со средним значением 5 мм и средним квадратическим отклонением 0,05 мм. При контроле бракуются шарики диаметр которых отличается от номинального больше, чем на 0,1 мм. Определить, какой процент шариков в среднем будет отбраковываться?

19. Время ожидания у бензоколонки является случайной величиной X , распределённой по показательному закону со средним временем ожидания $t_0 = 10$ минут. Найти вероятности следующих событий: $A = \{\frac{t_0}{2} \leq X \leq \frac{3t_0}{2}\}$ и $B = \{X \geq 2t_0\}$.

20. $n = 100, k = 9, \alpha = 0,1$.

11.07, 16.85, 13.80, 15.48, 13.87, 12.19, 5.78, 18.68, 13.62, 19.15, 14.16, 16.83, 14.81, 18.20, 15.02, 15.12, 14.05, 19.26, 6.77, 12.18, 14.89, 19.39, 8.48, 15.21, 20.14, 16.06, 11.78, 13.90, 16.84, 16.26, 21.96, 18.59, 10.44, 16.75, 11.50, 10.94, 10.91, 14.22, 12.37, 2.05, 17.62, 20.46, 9.07, 8.15, 15.64, 11.30, 10.01, 16.56, 10.59, 14.20, 11.61, 15.38, 13.25, 17.16, 14.82, 12.03, 14.47, 4.67, 10.74, 9.43, 13.84, 16.54, 10.68, 14.25, 15.19, 18.04, 15.95, 15.35, 14.13, 9.54, 18.95, 18.50, 13.70, 15.68, 17.16, 8.91, 11.91, 15.61, 10.37, 13.90, 15.28, 19.24, 15.77, 15.94, 17.56, 20.28, 12.19, 17.04, 14.77, 16.59, 14.34, 16.01, 13.70, 16.33, 24.62, 17.92, 10.40, 15.61, 11.33, 9.12

Вариант 3.

1. $y' \sin x - y \cos x = 0$

2. $y' - 4xy = 2x e^{x^2}, y(0) = 1$

3. $y'' = \frac{y'}{x} + 1$

4. $y'''' - 7y'' = 0$

5. $y'' + 4y' + 5y = 25x, y(0) = 2, y'(0) = 0$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$

8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{\ln n}}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n (x+2)^n}{n}$

10. $\int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x} dx$

11. $f(x) = \frac{\pi - x}{2}, x \in (-\pi; \pi)$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность, что сумма выпавших очков равна семи.

13. Из коробки, в которой находятся 12 карандашей и 8 ручек, наугад вынимают семь предметов. Найти вероятность того, что вынуты 3 ручки и 4 карандаша.

14. Из 10 стрелков три стрелка попадают в мишень с вероятностью 0,8, пять стрелков — с вероятностью 0,7, два стрелка — с вероятностью 0,6.

1) Найти вероятность того, что случайно выбранный стрелок попал в цель.

2) Случайно выбранный стрелок попал в цель. С какой вероятностью этот стрелок принадлежит второй группе?

15. Из партии контролёр берёт деталь и проверяет её на стандартность. Если деталь оказывается нестандартной, то дальнейшие испытания прекращаются. Если деталь окажется стандартной, то контролёр берёт следующую и так далее, но всего он проверяет не более четырёх деталей. Вероятность взятия нестандартной детали равна 0,2. Найдите закон распределения случайной величины X , равной числу проверенных деталей.

16.

x_i	-1	0	3	5	6
p_i	0,1	0,3	p	0,2	0,1

 $A = \{X = 4\}; B = \{-1 < X \leq 5\}; C = \{X \geq 3\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{2}x & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2} & \text{при } 1 \leq x < 2, \\ \frac{1}{4}x & \text{при } 2 \leq x < 4, \\ 1 & \text{при } x \geq 4; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[\frac{1}{2}; 3\right]$$

18. При взвешивании тела получен средний вес $m = 2,3$; среднее квадратическое отклонение веса $\sigma = 0,02$ г. Какое отклонение веса тела от среднего веса можно гарантировать с вероятностью 0,9? Считается, что вес распре-

лён нормально.

19. Трамваи идут с интервалом 5 мин. Пассажир подходит к трамвайной остановке в некоторый момент времени. Какова вероятность появления пассажира не ранее, чем через минуту после ухода предыдущего трамвая, но не позднее, чем за две минуты до отхода следующего трамвая? Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины, равной времени ожидания трамвая.

20. $n = 80$, $k = 9$, $\alpha = 0,001$.

15.80, 108.89, 16.42, 58.76, 3.24, 13.59, 11.37, 13.45, 4.72, 29.12, 0.17, 34.31, 16.56, 4.40, 5.51, 13.33, 14.77, 90.76, 43.48, 8.74, 22.98, 21.14, 10.23, 1.15, 26.33, 9.50, 28.58, 4.52, 42.66, 0.65, 8.15, 15.86, 5.18, 31.59, 2.13, 38.09, 14.87, 5.73, 4.19, 5.09, 17.44, 0.97, 17.73, 10.98, 24.68, 0.65, 2.96, 28.92, 10.89, 12.67, 1.34, 1.83, 5.52, 5.88, 12.25, 12.81, 28.70, 8.53, 2.92, 1.01, 26.63, 5.16, 12.81, 0.76, 27.82, 3.00, 8.69, 2.40, 7.80, 36.32, 43.78, 17.72, 2.90, 11.84, 52.13, 20.13, 29.90, 14.91, 27.36, 29.51

Вариант 4.

1. $(5 + y^2) + y' y (1 - x^2) = 0$

2. $y' - 4xy = 4x^3 e^{2x^2}$, $y(0) = 0$

3. $y'' \operatorname{ctg} x + 2y' = 0$

4. $y''' - 3y'' - 4y' = 0$

5. $y'' - 6y' + 9y = 9x^2 - 3x - 4$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 5$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n 2^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n^3}$

10. $\int_0^{0,25} x \sin 2x dx$

11. $f(x) = 2x + 1$, $x \in (-1; 1)$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность, что произведение выпавших очков делится на 3.

13. В книжной лотерее разыгрывается пять книг. Всего в урне имеется 20 билетов. Первый подошедший к урне вынимает четыре билета. Определить вероятность того, что два из этих билетов окажутся выигрышными.

14. В сеансе одновременной игры в шахматы с гроссмейстером играют 10 перворазрядников, 15 второразрядников и 20 третьеразрядников. Вероятность того, что перворазрядник выиграет у гроссмейстера равна 0,2, для второразрядника эта вероятность равна 0,1, а для третьеразрядника — 0,05. 1) Найти вероятность того, что случайно выбранный участник выиграет. 2) Случайно выбранный участник выиграл. С какой вероятностью это был третьеразрядник?

15. Известно, что в партии из 20 телефонных аппаратов имеется пять недействующих. Случайным образом из этой партии взято 4 аппарата. Найти закон распределения случайной величины X — числа недействующих аппаратов среди выбранных.

16.

x_i	-3	-1	4	6	8
p_i	0,2	0,3	p	0,2	0,1

 $A = \{X \geq 4\}; B = \{-3 \leq X < 4\}; C = \{X = 7\}.$

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{8}x^2 & \text{при } 0 \leq x < 2, \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} & \text{при } 2 \leq x < 3, \\ 1 & \text{при } x \geq 3; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]$$

18. Коробки с шоколадом упаковываются автоматически. Их средняя масса равна 1,06 кг. Известно, что 5% коробок имеют массу, меньшую 1 кг. Каков процент коробок, масса которых превышает 940 г, если масса коробок распределена нормально?

19. Случайная величина T — время поиска затонувшего судна до его обнаружения. Вероятность обнаружить судно за время поиска t задаётся формулой: $P(T < t) = 1 - e^{-0,05t}$. Определить среднее время поиска, необходимое для обнаружения судна. Найти вероятность того, что время поиска не превышает среднего времени поиска.

20. $n = 80, k = 8, \alpha = 0,3$.

12.81, 36.90, 6.34, 60.26, 4.35, 13.90, 0.47, 19.85, 15.19, 8.90, 2.29, 53.95, 6.35, 10.06, 8.85, 3.38, 53.54, 15.70, 4.68, 0.82, 26.88, 20.18, 23.30, 11.68, 18.18, 11.01, 4.29, 14.18, 6.42, 66.90, 12.60, 24.40, 13.18, 16.91, 9.48, 7.17, 9.47, 0.37, 7.40, 2.63, 6.50, 5.21, 4.33, 7.66, 4.22, 9.82, 20.75, 4.39, 17.70, 36.47, 45.63, 21.84, 19.30, 2.84, 55.45, 8.96, 1.74, 18.16, 31.83, 9.80, 22.07, 11.94, 1.89, 17.52, 9.05, 22.70, 35.20, 10.12, 24.06, 5.89, 6.15, 0.50, 36.85, 0.42, 2.36, 12.03, 0.47, 3.46, 1.36, 18.17

Вариант 5.

1. $y \ln y + x y' = 0$

2. $y' - 3x^2 y = x^2 e^{x^3}, y(0) = 0$

3. $x y'' - 2y' = -\frac{2}{x^2}$

4. $y''' + 2y'' + 5y' = 0$

5. $y'' - 4y' + 13y = 26x + 5, y(0) = 1, y'(0) = 1$

6.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{2^n}$$

7.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

8.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$$

9.
$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n (x+1)^n$$

10.
$$\int_0^{0,5} \frac{\sin 2x}{x} dx$$

11.
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\pi; 0] \\ 2, & x \in (0; \pi) \end{cases}$$

12. Все грани куба раскрасили следующим образом: каждые две противоположные грани — одного цвета: красного, жёлтого или фиолетового; любые две грани, имеющие общее ребро, — разных цветов. Затем кубик распилили на 125 одинаковых кубиков и тщательно перемешали. Найти вероятность того, что наудачу извлечённый кубик имеет только одну окрашенную грань.

13. В группе из 12 человек четверо имеют спортивные разряды. Случайным образом группа разбивается на две команды с одинаковым числом участников. Определить вероятность того, что в каждой команде окажется равное число разрядников.

14. В цехе фабрики 30% продукции производится на первом станке, на втором — 25%, а остальная продукция — на третьем станке. Первый станок дает 1% брака, второй — 2%, третий — 3%. 1) Найти вероятность того, что случайно выбранная единица продукции оказалась бракованной. 2) Случайно выбранная единица продукции оказалась бракованной. Найти вероятность того, что она произведена на третьем станке.

15. Два стрелка стреляют по одной мишени, делая независимо друг от друга по два выстрела. Вероятность попадания в мишень для первого стрелка равна 0,5, для второго — 0,6. Найдите закон распределения случайной величины X , равной общему числу попаданий в мишень.

16.	x_i	-2	-1	2	4	5
	p_i	0,1	p	0,1	0,2	0,3

$$A = \{X = 0\}; B = \{X < 2\}; C = \{-1 < X \leq 4\}.$$

17.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{2}x & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}x^2 - x + 1 & \text{при } 1 \leq x < 2, \\ 1 & \text{при } x \geq 2; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[0; \frac{3}{2}\right]$$

18. При весе некоторого изделия в 10 кг найдено, что отклонение по абсолютному значению превосходящее 50 г, встречается в среднем 34 раза на каждые 1000 изделий. Допуская, что вес изделия распределен по нормальному закону, определить его среднее квадратическое отклонение. Найти вероятность отклонения веса по абсолютному значению не превосходящее 30 г.

19. Функция распределения случайной величины T , равной времени безот-

казной работы радиоаппаратуры, имеет вид:

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-0,04t} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Найти плотность вероятности $f(t)$ и среднее время безотказной работы радиоаппаратуры.

20. $n = 80$, $k = 9$, $\alpha = 0,001$.

−22.64, −43.90, 9.72, −30.07, −32.16, −46.28, −32.11, −47.22, −19.67, −4.31, −12.14, −44.61, −45.15, −3.37, 4.31, −17.97, −43.45, −0.45, −29.71, −32.36, −5.22, −49.38, −47.09, −9.93, −13.79, −18.43, −6.22, −7.56, −3.12, −32.72, −8.45, −16.60, −26.21, −46.30, −3.19, −29.74, −13.53, −5.52, −43.71, −42.33, −17.03, −20.89, 3.43, −2.06, −5.94, −46.92, −45.63, −44.69, −2.10, 6.58, −8.98, −42.08, −6.64, −43.38, −42.95, −11.56, −30.27, −10.77, −5.05, −15.01, −5.60, −35.91, −5.90, 8.24, 2.02, −44.83, −28.01, −27.85, −8.90, −14.12, −2.64, −27.94, −37.64, −44.80, −3.68, −37.66, −26.70, −16.89, −36.26, −11.48

Вариант 6.

1. $(1 - x^2) y' + xy^2 + x = 0$

2. $y' - \frac{y}{x} = -\frac{2}{x^2}$, $y(1) = 1$

3. $xy'' + 2y' = 0$

4. $y''' + 5y'' - 14y' = 0$

5. $y'' - 5y' - 6y = e^x(-10x - 3)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 8$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n! 3^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+2}{3n+1} \right)^n$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^3}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{3^n}$

10. $\int_0^{0,5} e^{-\frac{x^2}{4}} dx$

11. $f(x) = x + 1$, $x \in (-\pi; \pi)$

12. В коробке лежат девять карточек, на которых написаны цифры от 1 до 9. Последовательно вынимают две карточки и кладут их рядом — получают двузначное число. Например, вынуты карточки с числами 1 и 3 — получили число 13, вынуты карточки с числами 3 и 1 — получили число 31. Найти вероятность, что полученное число не содержит чётных цифр.

13. На складе телеателье имеется пятнадцать кинескопов, причём десять из них изготовлены московским, а остальные — нижегородским заводами. Найти вероятность того, что среди пяти наудачу взятых кинескопов окажется три кинескопа, изготовленных московским заводом.

14. В специализированную больницу поступают больные с тремя болезнями: в среднем 50% больных с первой болезнью, 30% — со второй, 20% — с третьей. Вероятности излечения первой, второй и третьей болезни равны

0,7, 0,8, 0,9 соответственно. 1) Найти вероятность того, что поступивший в больницу больной выздоровел. 2) Поступивший в больницу больной выздоровел. Найти вероятность того, что он болел первой болезнью.

15. Вероятность нормального расхода горючего в автопарке в течение дня равна 0,8. Найдите закон распределения случайной величины X , равной числу дней с нормальным расходом гоючего за рабочую неделю (за 5 дней).

16.

x_i	-2	2	3	5	6
p_i	0,2	0,4	p	0,2	0,1

 $A = \{X \geq 3\}$; $B = \{2 \leq X < 5\}$; $C = \{X = -1\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{4}x & \text{при } 0 \leq x < 2, \\ \frac{1}{2} & \text{при } 2 \leq x < 5, \\ \frac{1}{2}x - 2 & \text{при } 5 \leq x < 6, \\ 1 & \text{при } x \geq 6; \end{cases} \quad \text{отрезок } [1; 5]$$

18. Распределение пакетов по весу расфасованного товара подчинено закону нормального распределения со средним арифметическим 1 кг и средним квадратическим отклонением 1,2 г. Определить вероятность того, что: а) вес наудачу взятого пакета будет не меньше 997 г; б) вес наудачу взятого пакета будет отклоняться от нормы не более, чем на 2 г.

19. Маршрутный автобус ходит через данную остановку с интервалом 10 минут. Вы подходите к остановке в случайный момент времени. Предполагая, что время ожидания автобуса на остановке имеет равномерный закон распределения, найдите среднюю продолжительность и среднее квадратическое отклонение этого времени.

20. $n = 70$, $k = 9$, $\alpha = 0,1$.

-0.93, 2.97, 2.43, 7.09, 7.78, -2.62, -2.21, -4.79, 6.88, 6.69, 2.84, 5.58, 13.52, 3.18, -5.15, 6.91, 2.01, 5.10, 0.11, -1.14, 11.64, 10.91, 6.13, 1.19, 1.60, 1.91, 2.61, -3.13, 7.97, 5.95, 3.32, 2.25, 6.45, 3.89, 2.62, 1.92, 4.56, 6.36, 8.05, 10.33, -7.24, 4.10, 6.04, -2.87, 1.52, 5.88, 10.97, 3.44, 8.36, -1.98, 8.02, 7.71, 9.10, 0, 3.57, -4.58, 5.42, 3.37, 2.09, 1.71, 3.38, 0.02, 2.67, -0.32, -0.68, 0.67, 14.76, 13.01, 5.25, 1.13

Вариант 7.

1. $\sqrt{4-x^2} y' + x (y^2 + 1) = 0$
2. $y' - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^3$, $y(0) = \frac{1}{2}$
3. $(1 + \sin x) y'' = y' \cos x$
4. $y'''' - 81y = 0$
5. $y'' + 6y' + 9y = 25 e^{2x}$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 2$

6.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

7.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$$

8.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10}{n^2}$$

9.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3n^2}$$

10.
$$\int_0^{0,5} \frac{dx}{1+x^3}$$

11. $f(x) = |x|, x \in (-3; 3)$

12. На пяти одинаковых карточках написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5. Две карточки вынимаются одна за другой. Найти вероятность того, что число на второй карточке будет больше, чем на первой, если первая карточка после вынимания не смешивается с остальными.

13. Среди десяти люминесцентных ламп имеется три негодных. Определить вероятность того, что среди шести случайно выбранных ламп две окажутся негодными.

14. По каналу связи с вероятностью 0,4 передается сигнал «0», и с вероятностью 0,6 передается сигнал «1». Из-за помех возможны ошибки. Вероятность принять «1», когда передавался сигнал «0» равна 0,05. Вероятность принять «0», когда передавался сигнал «1» равна 0,1. 1) Найти вероятность приема сигнала «1». 2) Принят сигнал «1». Найти вероятность того, что действительно передавался сигнал «1».

15. Рабочий обслуживает 4 одинаковых станка. Вероятность того, что в течение часа станок потребует регулировки, равна $1/3$. Составить закон распределения числа станков, потребовавших регулировки.

x_i	-2	0	2	4	5
p_i	0,1	0,2	p	0,2	0,1

 $A = \{0 \leq X < 4\}; B = \{X \leq 4\}; C = \{X = 3\}.$

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{2}x^2 & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{6}x + \frac{1}{3} & \text{при } 1 \leq x < 4, \\ 1 & \text{при } x \geq 4; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[\frac{1}{2}; 3\right]$$

18. Распределение деталей по затратам времени на одну операцию подчиняется закону нормального распределения со средней арифметической 55 сек и средним квадратическим отклонением 4 сек. Определить вероятность того, что: а) продолжительность обработки взятой наудачу детали не превысит 60 сек; б) продолжительность обработки каждой из шести наудачу взятых деталей не превысит 65 сек.

19. Время безотказной работы телевизора распределено по показательному

закону с плотностью $f(t)$:

$$f(t) = \begin{cases} 0,002 e^{-0,002t} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Найти вероятность того, что телевизор проработает: а) более 1000 часов; б) менее 1500 часов.

20. $n = 100$, $k = 7$, $\alpha = 0,1$.

1.34, 59.45, 11.28, 27.76, 24.61, 1.63, 19.27, 24.31, 38.79, 54.74, 19.91, 15.61, 67.86, 53.76, 15.83, 31.17, 27.17, 1.79, 22.03, 18.65, 9.09, 5.87, 14.66, 150.45, 15.71, 14.62, 12.14, 63.69, 33.65, 1.26, 48.49, 55.90, 8.26, 43.50, 4.23, 45.98, 34.42, 17.76, 13.15, 42.59, 18.85, 58.03, 8.52, 111.83, 44.00, 2.34, 16.54, 1.88, 64.62, 17.14, 20.60, 10.28, 30.03, 39.32, 32.41, 7.04, 11.08, 30.37, 55.98, 21.80, 9.27, 6.89, 16.27, 5.20, 42.36, 2.90, 1.11, 33.36, 28.51, 30.58, 0.60, 28.57, 73.82, 31.83, 32.30, 0.73, 7.57, 40.67, 46.82, 9.61, 16.59, 4.42, 52.30, 62.08, 14.53, 7.93, 5.14, 19.54, 53.25, 13.48, 21.33, 27.92, 4.11, 15.41, 0.08, 14.25, 0.90, 38.73, 0.74, 4.77

Вариант 8.

1. $y' y \sqrt{\frac{1-x^2}{1-y^2}} + 1 = 0$

2. $y' + \frac{y}{2x} = x$, $y(1) = 0$

3. $x^3 y'' + x^2 y' = 1$

4. $y''' - 9y'' + 8y' = 0$

5. $y'' - 2y' + y = 16e^x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n+1}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n e^{-n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[4]{n}}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+5)^n}{\sqrt{n}}$

10. $\int_0^{0,2} \cos\left(\frac{5x}{2}\right)^2 dx$

11. $f(x) = x - 1$, $x \in (-1; 1)$

12. Найти вероятность того, что на кости, наудачу извлечённой из полного набора домино, сумма цифр делится на 3.

13. Из 20 человек, среди которых 14 юношей и 6 девушек, случайным образом выбирается команда из шести человек. Найти вероятность того, что в команде окажутся ровно 2 девушки.

14. В первой урне содержится 5 белых и 6 черных шаров, во второй урне содержится 5 белых и 3 черных шара. Из первой урны наугад вынимают один шар и перекладывают его во вторую урну. Затем из второй урны вынимают один шар. 1) Найти вероятность того, что этот шар белый. 2) Вынутый шар оказался белым. Найти вероятность того, что из первой урны во вторую был

переложен черный шар.

15. Вероятность того, что студент опоздает на первую пару, равна 0,2. Составить закон распределения случайной величины, равной числу опозданий за учебную неделю (за 5 дней).

16.

x_i	-3	-1	3	4	6
p_i	0,1	0,2	p	0,3	0,2

 $A = \{X = -2\}; B = \{3 \leq X < 6\}; C = \{X \leq 3\}.$

17.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{6}x & \text{при } 0 \leq x < 3, \\ \frac{1}{2}x^2 - 3x + 5 & \text{при } 3 \leq x < 4, \\ 1 & \text{при } x \geq 4; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[2; \frac{7}{2}\right]$$

18. Распределение заводов по проценту выполнения плана подчиняется закону нормального распределения со средней арифметической 103,3% и средним квадратическим отклонением 1,5%. Определить какая часть заводов не выполнит план и какая часть заводов перевыполнит план более, чем на 3%?

19. Длительность времени безотказной работы элемента имеет показательное распределение с функцией распределения $F(t)$:

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-0,02t} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Определить вероятность того, что: а) за 24 часа элемент откажет; б) за 48 часов элемент не откажет.

20. $n = 80, k = 8, \alpha = 0,02.$

-1.30, -1.54, -1.86, -1.62, 3.29, 0.05, -8.37, -1.56, -4.54, -4.83, -4.94, 7.26, -1.56, 3.63, -10.53, -0.03, -0.27, -6.44, -0.22, 3.46, -0.92, 0.73, 0.31, -9.42, -0.20, -1.80, 0.61, 6.03, 3.39, -1.50, 2.80, 2.42, 1.08, -0.86, 0.38, 0.22, -2.44, -8.24, -7.72, 5.39, -7.63, -1.32, 0.09, -3.80, -0.30, -2.28, -1.59, -3.77, -3.51, -2.15, -6.77, -4.58, -11.40, -3.74, 3.10, -4.38, -0.93, -5.80, -9.28, -4.17, -2.13, -5.94, 0.84, -3.94, 0.28, 2.14, 5.97, -1.79, -1.38, -4.45, -5.51, -5.08, 7.09, -3.23, -2.20, -2.95, 2.94, -5.89, -5.84, -10.31

Вариант 9.

1. $\sqrt{4+x^2} dx - 4y dy = x^2 y dy$
2. $y' - \frac{y}{x} = x^2, y(1) = 0$
3. $x^5 y'' + x^4 y' = 9$
4. $y''' - 6y'' + 9y' = 0$
5. $y'' + y = 4e^x, y(0) = 4, y'(0) = -3$

6.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{8^n}$$

7.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{4n+3} \right)^n$$

8.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{\sqrt{n^3}}$$

9.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{n}(x-4)^n$$

10.
$$\int_0^{0,4} \frac{\ln(1+x^2)}{x} dx$$

11. $f(x) = x, x \in (-5; 5)$

12. Все грани куба раскрасили следующим образом: каждые две противоположные грани — одного цвета: синего, оранжевого или коричневого; любые две грани, имеющие общее ребро, — разных цветов. Затем кубик распилили на 64 одинаковых кубика и тщательно перемешали. Найти вероятность того, что наудачу извлечённый кубик имеет ровно две окрашенные грани.

13. В кармане у студента находилось 14 карамельных конфет и 6 шоколадных. Из-за дырки в кармане 7 конфет потерялось. Найти вероятность того, что в кармане осталось 8 карамельных конфет и 5 шоколадных.

14. Из деталей высокого качества собирается 60% всех телевизоров, при этом вероятность благополучной эксплуатации телевизора в течение времени T равна 0,95. Для телевизора, собранного из обычных деталей, эта вероятность равна 0,7. 1) Найти вероятность того, что наугад выбранный телевизор проработает без поломок в течение времени T . 2) Найти вероятность того, что телевизор, проработавший без поломок в течение времени T , собран из деталей высокого качества.

15. Вероятность поломки каждого из четырёх приборов равна 0,2. Составить закон распределения случайной величины, равной числу сломавшихся приборов.

16.

x_i	-5	-2	1	5	6
p_i	0,2	0,1	p	0,2	0,3

 $A = \{-5 < X \leq 5\}; B = \{X = 3\}; C = \{X > 1\}.$

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{4}x & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{4} & \text{при } 1 \leq x < 4, \\ \frac{3}{4}x - \frac{11}{4} & \text{при } 4 \leq x < 5, \\ 1 & \text{при } x \geq 5; \end{cases} \quad \text{отрезок } [1; 3]$$

18. Размер деталей подчинён нормальному распределению со средней арифметической 15 мм и дисперсией 0,25 мм². Определить ожидаемый процент брака, если допустимые размеры находятся в пределах от 14 до 17 мм. Как нужно изменить дисперсию, чтобы при допустимых размерах от 14 до 16 мм процент брака составлял бы 0,01?

19. Некто ожидает телефонный звонок между 19 и 20 часами. Время ожида-

ния звонка есть случайная величина, равномерно распределённая на отрезке [19; 20]. Найти вероятность того, что звонок поступит в промежутке от 19 часов 22 минут до 19 часов 46 минут. Найти среднее квадратическое отклонение.

20. $n = 90$, $k = 9$, $\alpha = 0, 2$.

−23.11, −19.11, −20.89, −27.91, −24.65, 0.82, 16.98, −12.28, −9.47, 19.22, 17.28, 3.83, 19.42, 8.34, −13.17, 3.12, −17.79, −15.22, 4.01, −3.61, −9.42, 0.13, 7.53, −0.82, −2.41, −0.82, −4.41, −25.87, 5.98, 19.81, −12.27, 18.56, −12.68, 14.33, −7.27, −9.33, −19.11, −23.72, −14.55, 6.31, 9.14, 4.69, −29.51, 12.16, 16.12, 8.55, −27.87, −11.09, 5.22, 6.48, −18.79, −16.55, 3.65, −6.13, 1.19, −18.18, −21.14, 11.48, 8.35, 16.72, −24.61, −20.89, −25.05, −5.51, −20.34, 14.79, −25.05, −27.79, −2.14, 8.62, −14.40, −21.05, −13.05, −19.49, −4.49, 15.32, 1.45, −24.92, −10.46, −27.27, −4.94, −8.41, 19.88, 10.58, −5.72, 14.72, −23.12, −10.50, 16.37, 15.87

Вариант 10.

1. $x\sqrt{1+y^2} + yy'(1+x^2) = 0$

2. $y' - \frac{y}{x} = x \sin x$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$

3. $x^2 y'' + xy' = 1$

4. $y''' - 2y'' - 8y' = 0$

5. $y'' + 81y = 162e^{9x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 9$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{n3^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9+n^2}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$

10. $\int_0^1 \sin x^3 dx$

11. $f(x) = \begin{cases} 2, & x \in (-\pi; 0] \\ -1, & x \in (0; \pi) \end{cases}$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что на верхних гранях появятся только чётные числа.

13. На стоянке находятся 10 грузовых автомобилей и 15 легковых. Случайным образом уехали 15 машин. Найти вероятность того, что на стоянке осталось одинаковое число легковых и грузовых машин.

14. ОТК проводит контроль выпускаемых приборов. Приборы содержат скрытые дефекты с вероятностью 0,15. При проверке наличие дефекта обнаруживается с вероятностью 0,9. Кроме того, с вероятностью 0,05 исправный прибор может быть ошибочно признан дефектным. При обнаружении дефекта прибор бракуется. 1) Найти вероятность того, что наугад выбранный прибор будет забракован. 2) Найти вероятность того, что забракованный прибор действительно имеет дефект.

15. Вероятности попадания в мишень при одном выстреле для каждого из

трёх стрелков равны соответственно 0,7, 0,85, 0,8. Каждый стрелок делает по одному выстрелу. Составить закон распределения случайной величины, равной общему числу попаданий.

16.

x_i	-1	1	2	4	6
p_i	0,2	0,3	0,3	p	0,1

 $A = \{X \geq 2\}; B = \{1 \leq X < 4\}; C = \{X = 0\}.$

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{3}{16}x^2 & \text{при } 0 \leq x < 2, \\ \frac{1}{4}x + \frac{1}{4} & \text{при } 2 \leq x < 3, \\ 1 & \text{при } x \geq 3; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[1; \frac{5}{2}\right]$$

18. Диаметр валиков, обработанных на токарном станке, подчинён закону нормального распределения со средней арифметической 23 мм и средним квадратическим отклонением 0,5 мм. Определить вероятность того, что взятый наудачу валик будет иметь диаметр в пределах от 22 до 24 мм. Как нужно изменить среднее квадратическое отклонение, чтобы вероятность иметь диаметр в указанном диапазоне была бы равна 0,95?

19. Время T выхода из строя радиостанции подчинено показательному закону распределения с плотностью $f(t)$:

$$f(t) = \begin{cases} 0,2 e^{-0,2t} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Найти среднее время работы радиостанции и вероятность того, что радиостанция сохранит работоспособность от 1 до 5 часов работы.

20. $n = 100, k = 7, \alpha = 0,01.$

10.53, 9.23, 9.45, 6.40, 10.53, 8.22, 10.48, 11.83, 13.00, 9.85, 8.92, 8.93, 12.87, 8.05, 14.05, 10.26, 11.65, 8.28, 11.67, 8.30, 10.50, 10.79, 14.38, 8.02, 11.01, 11.16, 12.99, 7.65, 12.39, 12.59, 11.33, 12.22, 10.67, 11.03, 8.23, 11.70, 10.45, 10.09, 10.08, 9.61, 10.73, 8.74, 9.50, 9.70, 8.73, 10.85, 5.35, 9.46, 9.66, 7.17, 9.43, 8.54, 10.40, 11.82, 9.46, 11.25, 13.90, 9.40, 8.33, 11.18, 11.85, 10.48, 10.14, 7.65, 6.24, 9.25, 11.23, 7.58, 8.59, 8.70, 7.71, 13.22, 8.86, 13.42, 8.61, 8.41, 12.87, 12.77, 7.91, 8.69, 5.93, 8.10, 11.22, 9.14, 10.09, 5.82, 10.03, 7.84, 12.68, 9.49, 10.00, 13.04, 11.91, 10.48, 7.67, 9.56, 9.28, 7.05, 9.78, 11.71

Вариант 11.

1. $y(1 - \ln y) + xy' = 0$

2. $xy' + y = \ln x, y(1) = 1$

3. $2xy'' = y'$

4. $y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0$

5. $y'' + y = 1, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \qquad 7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{3n+2}{2n+1} \right)^n \qquad 8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{n\sqrt[3]{n}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{n+1} \qquad 10. \int_0^1 \frac{\sin x^2}{x} dx \qquad 11. f(x) = 1 - x, x \in (-\pi; \pi)$$

12. В коробке лежат десять карточек, на которых написаны цифры от 0 до 9. Последовательно вынимают две карточки. Найти вероятность, что первое число больше второго.

13. В партии из 25 деталей 5 деталей бракованных. Найти вероятность того, что среди выбранных для проверки 4 деталей будет ровно одна бракованная.

14. Прибор может работать в двух режимах: A и B . Режим A имеет место в 80% всех случаев работы прибора, режим B — в 20%. Вероятность выхода прибора из строя за время T в режиме A равна 0,1, в режиме B — 0,7.

1) Найти вероятность выхода прибора из строя за время T . 2) Прибор вышел из строя за время T . Какова вероятность, что он работал в режиме B ?

15. Среди изготавливаемых рабочим деталей в среднем 10% брака. Всего рабочий изготовил 5 деталей. Составить закон распределения числа бракованных деталей.

x_i	-2	-1	1	2	4
p_i	p	0,1	0,2	0,3	0,2

$$A = \{X \leq 1\}; B = \{X = 0\}; C = \{-2 \leq X < 2\}.$$

$$17. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{8}x & \text{при } 0 \leq x < 2, \\ \frac{3}{16}x^2 - \frac{3}{4}x + 1 & \text{при } 2 \leq x < 4, \\ 1 & \text{при } x \geq 4; \end{cases} \quad \text{отрезок } [1; 3]$$

18. Срок службы прибора представляет собой случайную величину, подчиненную закону нормального распределения со средней арифметической 15 лет и средним квадратическим отклонением 2 года. Определить вероятность того, что прибор прослужит: а) до 20 лет; б) от 10 до 20 лет; в) свыше 20 лет.

19. Случайная величина T , равная длительности работы элемента, имеет плотность распределения $f(t)$:

$$f(t) = \begin{cases} 0,003 e^{-0,003t} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Найти среднее время работы элемента и вероятность того, что элемент проработает не менее 400 часов.

20. $n = 70, k = 10, \alpha = 0,1$.

−14.28, 4.21, −10.60, −32.26, −30.01, −19.65, −2.56, 1.28, −0.50, −24.07, −13.30, −35.50, −34.41, −33.19, −6.07, −15.24, −30.51, −15.25, −32.62, −37.25, 2.54, −11.97, 6.48, −5.17, −10.86, 0.77, 3.95, 9.45, −39.97, 3.27, −9.37, 9.50, −13.62, −16.02, 0.07, −28.61, −15.10, 5.04, −11.27, 2.26, −3.07, −10.70, −27.66, −6.68, −35.83, −8.70, −6.95, −3.51, 4.54, 9.12, −1.55, −10.93, 6.42, −11.00, −39.15, −33.96, 3.14, −15.79, 2.24, −29.53, −12.39, −8.51, −38.40, −9.26, −21.88, −37.52, −15.52, −30.37, −33.85, −29.73

Вариант 12.

1. $2x + 2xy^2 + (2 - x^2) y' = 0$ 2. $y' + \frac{y}{x} = 3x, y(1) = 1$

3. $xy'' + y' = x + 1$ 4. $y''' + 2y'' - 24y' = 0$

5. $y'' + 9y = 18x + 9, y(0) = 0, y'(0) = 5$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$ 7. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^n$ 8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^5 n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \sqrt{n}}$ 10. $\int_0^{0,5} \sin 4x^2 dx$ 11. $f(x) = 2|x|, x \in (-\pi; \pi)$

12. Все грани куба раскрасили следующим образом: каждые две противоположные грани — одного цвета: зелёного, розового или голубого; любые две грани, имеющие общее ребро, — разных цветов. Затем кубик распилили на 343 одинаковых кубика и тщательно перемешали. Найти вероятность того, что наудачу извлечённый кубик имеет хотя бы одну окрашенную грань.

13. На полке стоят 9 книг по истории и 13 по географии. При протирании полки упали 8 книг. Найти вероятность того, что упало одинаковое число книг по истории и по географии, если вероятности уронить каждую книгу одинаковые.

14. Из 5 стрелков два попадают в цель с вероятностью 0,6, а три — с вероятностью 0,4. 1) Что вероятнее: попадёт в цель наудачу выбранный стрелок или нет? 2) Наудачу выбранный стрелок попал в цель. Что вероятнее: принадлежит он к первым двум или к последним трём?

15. Оптовая база снабжает 6 магазинов, от каждого из которых может поступить заявка на очередной день с вероятностью 0,4 независимо от заявок других магазинов. Составить закон распределения числа поступивших заявок.

16.

x_i	-3	-1	0	3	4
p_i	0,3	0,1	0,2	0,1	p

 $A = \{X = 2\}; B = \{X > 0\}; C = \{-1 \leq X < 4\}.$

$$17. \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{3}{8}x & \text{при } 0 \leq x < 2, \\ \frac{3}{4} & \text{при } 2 \leq x < 4, \\ \frac{1}{8}x + \frac{1}{4} & \text{при } 4 \leq x < 6, \\ 1 & \text{при } x \geq 6; \end{cases} \quad \text{отрезок } [1; 7]$$

18. Измерительный прибор не имеет систематических ошибок измерения, а случайные распределены по нормальному закону. Найти среднее квадратическое отклонение, если случайные ошибки с вероятностью 0,8 не выходят за пределы ± 20 м. С какой вероятностью ошибки не выходят за пределы ± 10 м?

19. Продолжительность телефонного разговора является случайной величиной, распределённой по показательному закону. Средняя продолжительность телефонного разговора равна 3 минуты. Найти вероятность того, что произвольный телефонный разговор будет продолжаться не более 9 минут. Найти функцию распределения.

20. $n = 70$, $k = 8$, $\alpha = 0,05$.

−4.33, −4.14, −5.05, −8.90, −3.93, −6.85, −6.89, −3.44, −3.80, −5.03, −4.19, −7.69, −3.36, −7.38, −5.64, −3.13, −6.17, −5.84, −3.35, −4.36, −4.09, −5.15, −7.00, −1.90, −8.23, −0.48, −1.03, −4.46, −3.46, −7.19, −5.41, −6.83, −4.61, −5.33, −3.93, −4.47, −4.02, −7.80, −3.49, −3.62, −6.83, −2.35, −8.16, −3.83, −4.84, −4.87, −5.57, −3.95, −6.45, −2.47, −7.21, −1.29, −4.84, −4.84, −5.49, −2.05, −5.44, −4.50, −5.05, −5.63, −5.21, −2.70, −6.93, −6.73, −9.26, −7.47, −3.55, −6.98, −3.86, −6.99

Вариант 13.

$$1. \quad 2x dx - y dy = y x^2 dy - x y^2 dx \quad 2. \quad y' + \frac{3y}{x} = \frac{2}{x^3}, y(1) = 1$$

$$3. \quad y'' \operatorname{tg} x = y' + 1 \quad 4. \quad y''' + 4y'' + 4y' = 0$$

$$5. \quad y'' - 2y' = 2e^x, y(0) = 0, y'(0) = 0$$

$$6. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$$

$$7. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n}$$

$$8. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^4}$$

$$9. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (x+2)^n$$

$$10. \quad \int_0^{0,4} e^{-\frac{3x^2}{4}} dx$$

$$11. \quad f(x) = \begin{cases} -x, & x \in (-\pi; 0] \\ 0, & x \in (0; \pi) \end{cases}$$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что на верхних гранях одно число окажется чётным, а другое нечётным.

13. У студента на даче живут 11 собак и 17 кошек. Уезжая на озеро студент

захватил с собой случайным образом пять животных. Найти вероятность того, что со студентом на озеро поехали 2 собаки и 3 кошки.

14. Ремонтная бригада завода обслуживает станки трёх типов: первого, второго и третьего, которые присутствуют на заводе в соотношении 1 : 2 : 3. Вероятности обращения к бригаде за время T для обслуживания станков каждого типа равны соответственно 0,5; 0,3; 0,2. В бригаду поступил вызов (событие A). Какого типа станок вероятнее всего требует ремонта?

15. Вероятность верного решения задачи каждым из отличников равна 0,95. Задачу решают 4 отличника независимо друг от друга. Составить закон распределения случайной величины, равной числу студентов, верно решивших задачу.

16.

x_i	-1	1	2	5	6
p_i	0,1	p	0,3	0,2	0,1

 $A = \{X < 5\}; B = \{-1 < X \leq 2\}; C = \{X = 3\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{4}x^2 & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{4}x & \text{при } 1 \leq x < 4, \\ 1 & \text{при } x \geq 4; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[\frac{1}{2}; 3\right]$$

18. Случайная величина X подчинена нормальному закону с математическим ожиданием 2,2 см и средним квадратическим отклонением 0,5 см. Какова вероятность того, что при первом испытании случайная величина окажется на участке $[3, 4]$, а при втором испытании — на отрезке $[1, 2]$?

19. Время безотказной работы элемента бортовой радиостанции подчинено показательному закону распределения с параметром $\lambda = 2,5 \cdot 10^{-5} \frac{1}{\text{час}}$. Требуется определить среднее время T безотказной работы и вероятности безотказной работы элемента за время $t = 1000$ часов и за время $t = T$.

20. $n = 90, k = 9, \alpha = 0,001$.

0.30, 3.73, -0.67, -0.66, -1.40, -0.74, 3.76, 2.04, 3.30, -2.93, 4.78, 4.05, 4.89, -2.16, -4.81, 2.06, -0.73, 2.11, -2.07, -0.81, -6.88, -0.28, -2.08, -2.70, 1.80, 0.24, 3.04, 1.91, -0.47, 3.41, 0.38, -5.20, -1.68, 0.85, 2.27, -0.45, -1.50, -0.16, -0.14, 1.86, -1.04, -2.26, -4.50, 1.67, -2.81, -2.07, -1.01, 0.60, 2.07, -0.15, 1.05, 2.66, 0.88, -3.39, -4.67, 2.21, -4.99, 0.41, -0.08, 2.99, 0.67, -2.24, 2.77, -1.05, -0.19, -3.55, -6.53, 5.85, 3.14, 1.20, 0.22, -0.61, 0.72, -2.67, -2.25, 0.22, -4.82, 1.02, 1.61, 6.39, -1.92, 0.91, 0.12, 2.48, -3.52, -0.08, -2.38, -0.27, -4.70, -1.22

Вариант 14.

1. $(1 + e^x) y y' = e^x$

2. $y' + \frac{y}{x} = e^x, y(1) = 0$

3. $x y'' + y' + x = 0$

4. $y''' + 3y'' - 4y' = 0$

5. $y'' + y = -\sin(2x), y(\pi) = 1, y'(\pi) = 1$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n 2^n}{3^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+2}{2n+1} \right)^{3n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n+1}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(x-2)^n}{n+1}$

10. $\int_0^{0,2} \frac{1 - e^{-x}}{x} dx$

11. $f(x) = 2x + 3, x \in (-\pi; \pi)$

12. В коробке лежат десять карточек, на которых написаны цифры от 0 до 9. Вынимают две карточки. Найти вероятность, что сумма цифр меньше десяти.

13. В ящике лежит 5 шариков зелёного цвета и 12 шариков синего цвета. Случайным образом достали 6 шариков. Найти вероятность того, что достали 2 зелёных шарика и 4 синих.

14. На конвейер поступают однотипные изделия, изготовленные двумя рабочими. При этом первый поставляет 60%, а второй — 40% общего числа изделий. Вероятность того, что изделие, изготовленное первым рабочим, окажется нестандартным, равна 0,005, а вторым — 0,01. Взятое наудачу с конвейера изделие оказалось нестандартным. Определить вероятность того, что оно было изготовлено первым рабочим.

15. В магазин вошли шесть покупателей. Вероятность совершить покупку для каждого из них равна 0,3. Составить закон распределения случайной величины, равной числу покупателей, совершивших покупку.

16.

x_i	-4	-2	1	2	5
p_i	0,2	0,3	0,2	p	0,1

 $A = \{X = 3\}; B = \{-4 < X \leq 2\}; C = \{X > 1\}.$

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{3}{4}x & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ x^2 - 2x + \frac{7}{4} & \text{при } 1 \leq x < \frac{3}{2}, \\ 1 & \text{при } x \geq \frac{3}{2}; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2} \right]$$

18. Диаметр детали, изготавливаемой на станке, — случайная величина, распределённая по нормальному закону с математическим ожиданием 25 см и дисперсией 0,16 см². Найти вероятность того, что взятая наудачу деталь имеет отклонение от математического ожидания по абсолютной величине не более 0,2 см.

19. Время в минутах ожидания ответа оператора интернет-компании распре-

делено по показательному закону распределения с плотностью:

$$f(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Определить вероятность того, что: а) время ожидания составит более одной минуты; б) время ожидания составит менее пяти минут.

20. $n = 90$, $k = 7$, $\alpha = 0,05$.

33.71, 5.18, 25.40, 5.19, 72.96, 14.98, 24.66, 25.14, 12.00, 19.12, 4.14, 22.33, 3.07, 6.04, 53.57, 56.38, 9.11, 50.64, 40.36, 44.45, 43.50, 27.61, 9.97, 18.36, 6.88, 54.02, 2.71, 40.64, 7.72, 11.30, 26.50, 6.82, 46.70, 109.46, 35.12, 14.61, 16.84, 2.75, 49.68, 99.47, 72.06, 7.42, 22.68, 11.17, 10.51, 5.28, 29.26, 30.31, 30.91, 10.35, 23.43, 11.20, 143.52, 1.67, 20.99, 0.95, 1.13, 4.64, 17.09, 1.15, 68.01, 45.83, 103.50, 47.01, 56.42, 86.97, 12.21, 159.60, 51.52, 2.67, 49.73, 24.65, 28.66, 3.76, 32.72, 17.71, 19.40, 27.85, 22.34, 6.63, 24.72, 22.51, 3.88, 3.08, 119.44, 76.98, 17.10, 7.45, 10.22, 31.04

Вариант 15.

1. $\sqrt{5 + y^2} dx + 4(x^2 y + y) dy = 0$ 2. $y' + \frac{2xy}{1 + x^2} = \frac{3x^2}{1 + x^2}$, $y(0) = 0$

3. $y'' \operatorname{tg} x = y'$ 4. $y''' - 9y'' + 8y' = 0$

5. $y'' + y = 48 \cos 5x + 72 \sin 5x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!}$ 7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{n+1}\right)^n$ 8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^4 n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-6)^n}{2^n}$ 10. $\int_0^{0,1} \frac{\ln(1+2x)}{x} dx$ 11. $f(x) = 3 - x$, $x \in (-3; 3)$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность, что произведение выпавших очков не превосходит 12.

13. На подносе лежат 24 пирожка, из которых 18 с повидлом. Случайным образом взяли 8 пирожков. Какая вероятность того, что на подносе осталось ровно 12 пирожков с повидлом?

14. В группе спортсменов 20 лыжников, 6 велосипедистов и 4 бегуна. Вероятность выполнить квалификационную норму такова: для лыжника — 0,9; для велосипедиста — 0,8 и для бегуна — 0,75. 1) Найти вероятность того, что наудачу выбранный спортсмен выполнит норму. 2) Спортсмен выполнил норму. Найти вероятность, что это бегун.

15. В среднем 10% автомобилей, производимых заводом, имеют брак. Для

контроля из партии автомобилей взяли 5 машин. Составить закон распределения случайной величины, равной числу бракованных автомобилей.

16.

x_i	-3	-2	0	3	4
p_i	0,1	0,1	p	0,2	0,3

 $A = \{X \geq 0\}; B = \{X = 1\}; C = \{-2 \leq X < 3\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{6}x & \text{при } 0 \leq x < 3, \\ \frac{1}{2} & \text{при } 3 \leq x < 6, \\ \frac{1}{2}x - \frac{5}{2} & \text{при } 6 \leq x < 7, \\ 1 & \text{при } x \geq 7; \end{cases} \quad \text{отрезок } [2; 5]$$

18. Поезд состоит из 100 вагонов. Масса каждого вагона — случайная величина, распределённая по нормальному закону с математическим ожиданием 65 тонн и средним квадратическим отклонением 0,9 тонн. Локомотив может везти состав не более 6600 тонн, в противном случае необходимо прицеплять второй локомотив. Найти вероятность того, что второй локомотив не потребуется.

19. Время безотказной работы радиоаппаратуры является случайной величиной X , распределённой по показательному закону с параметром $\lambda = 0,5$. Найти вероятность того, что радиоаппаратура: а) не выйдет из строя в течение времени $t = M(X)$; б) проработает более времени $t = 2M(X)$.

20. $n = 100, k = 7, \alpha = 0,02$.

-21.21, -18.66, -27.44, 8.11, -13.09, 2.32, 11.71, -0.05, 2.15, -3.29, -22.56, -0.58, 21.18, 22.44, -13.78, -17.49, 3.90, 8.42, -4.98, -17.64, 26.88, -25.08, -23.66, -21.48, -20.01, 7.26, 4.42, -26.88, 25.87, 13.72, 14.27, -26.20, 21.63, 26.06, 29.06, 21.54, 17.13, 0.80, -19.34, -6.08, -21.96, -28.15, 26.35, -11.92, -12.27, -10.02, -1.98, 8.89, -28.49, 20.53, 3.54, 21.25, -9.13, -3.24, -26.75, -19.37, 9.77, -10.15, 23.91, -22.91, 29.31, 2.40, 12.42, 29.97, -12.73, -5.13, -2.11, 15.84, 19.09, -23.99, -19.31, -8.42, -26.60, 1.31, -9.85, -19.46, -17.46, 24.31, 10.52, -1.89, 24.73, -23.76, 14.73, 14.18, 3.71, -18.95, 5.83, -12.00, -21.95, -17.24, 23.70, -25.71, -15.45, -26.77, -3.50, -29.20, 23.83, -18.20, -24.40, -11.56

Вариант 16.

1. $(e^{2x} + 2) dy + y e^{2x} dx = 0$
2. $y' + \frac{y}{x} = \sin x, y(\pi) = 1$
3. $x y'' - y' + \frac{1}{x} = 0$
4. $y''' + 36y' = 0$
5. $y'' - 3y' + 2y = 24e^{-2x}, y(0) = -1, y'(0) = 4$

6.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n}$$

7.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2}$$

8.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{3/2} n}$$

9.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$$

10.
$$\int_0^{0,5} \cos \sqrt{x} dx$$

11.
$$f(x) = \begin{cases} 4, & x \in (-3; 0] \\ 2, & x \in (0; 3) \end{cases}$$

12. В барабане револьвера семь гнёзд, из них в пяти заложены патроны, а два оставлены пустыми. Барабан приводится во вращение, в результате чего против ствола случайным образом оказывается одно из гнёзд. После этого нажимается спусковой крючок. Если гнездо было пустым, то выстрел не происходит. Найти вероятность того, что повторив такой опыт два раза подряд, мы оба раза не выстрелим.

13. На полке магазина вперемешку лежат 14 тетрадей в клетку и 12 в линейку. Случайным образом взяли 20 тетрадей. Найти вероятность того, что среди взятых тетрадей ровно 11 тетрадей в клетку.

14. Детали, поступающие на сборку, изготовлены тремя заводами, причём первый поставляет 40% всего количества, и вероятность того, что они отличного качества, равна 0,8, второй — 30% с вероятностью отличного качества 0,7, и третий — 30% с вероятностью отличного качества 0,9. Определить вероятность того, что оказавшаяся отличного качества деталь изготовлена на третьем заводе.

15. Два стрелка стреляют по одной мишени, делая независимо друг от друга по два выстрела. Вероятность промаха для первого стрелка равна 0,3, для второго — 0,2. Найдите закон распределения случайной величины X , равной общему числу попаданий в мишень.

16.

x_i	-3	-2	2	3	5
p_i	0,2	p	0,4	0,2	0,1

$$A = \{-2 \leq X < 3\}; B = \{X = 4\}; C = \{X \leq 2\}.$$

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -2, \\ \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} & \text{при } -2 \leq x < 0, \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{при } x \geq 1; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[-3; \frac{1}{2}\right]$$

18. Случайная величина X подчинена нормальному закону с нулевым математическим ожиданием. Вероятность попадания этой случайной величины на участок от -2 до 2 равна $0,5$. Найти среднее квадратическое отклонение σ .

19. Плотность распределения времени безотказной работы (измеряемого в

часах) одного из элементов прибора самолёта имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{540} e^{-\frac{t}{540}} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Найти вероятность: а) отказа элемента за время его работы в течение 648 часов; б) отказа элемента в интервале времени от 324 до 800 часов.

20. $n = 90$, $k = 8$, $\alpha = 0,05$.

3.88, 2.89, 3.58, 3.44, 1.57, 2.68, 3.38, 3.87, 1.91, 1.69, 5.03, 2.59, 3.28, 5.35, 2.24, 3.02, 3.13, 3.05, 3.89, 3.75, 3.68, 3.60, 1.53, 3.56, 3.59, 2.67, 4.02, 2.29, 3.22, 3.13, 3.29, 3.72, 2.57, 5.01, 3.52, 1.53, 1.12, 2.90, 2.90, 3.78, 3.86, 3.94, 1.83, 3.38, 2.40, 3.81, 4.88, 3.15, 2.43, 1.23, 3.23, 1.34, 2.75, 3.39, 3.51, 2.26, 4.26, 3.00, 2.34, 2.64, 4.98, 2.50, 1.86, 3.33, 4.55, 1.31, 3.18, 2.26, 3.11, 2.98, 2.44, 2.05, 4.70, 2.68, 4.66, 2.47, 1.92, 2.12, 3.34, 2.46, 4.19, 1.51, 2.73, 2.36, 1.82, 5.20, 3.17, 1.86, 3.64, 2.82

Вариант 17.

1. $x dx - 3y dy = y x^2 dy - x y^2 dx$ 2. $y' - \frac{y}{x+1} = e^x (x+1)$, $y(0) = 1$

3. $y'' \operatorname{ctg} x = 2y'$ 4. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$

5. $y'' - 5y' + 4y = 3e^{4x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{2^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[3]{\ln n}}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{\sqrt{n+1}}$

10. $\int_0^{1/3} \sqrt{1+x^3} dx$

11. $f(x) = \begin{cases} -2, & x \in (-\pi; 0] \\ 3, & x \in (0; \pi) \end{cases}$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность, что произведение выпавших очков равно шести.

13. Мимо остановки за день проехали 20 автобусов и 10 троллейбусов. Автобусы и троллейбусы едут независимо друг от друга. Из-за отсутствия пассажиров часть автобусов и троллейбусов (в сумме 10 машин) на остановке не остановились. Найти вероятность того, что на остановке не остановились 3 автобуса и 7 троллейбусов.

14. На проверку поступила партия микросхем, среди которых 10 процентов дефектных. При проверке дефект обнаруживается с вероятностью 0,95. С вероятностью 0,03 исправная микросхема может быть признана дефектной. Проверили одну микросхему. 1) Найти вероятность следующего события А: проверенная микросхема признана дефектной; 2) Событие А произошло, то есть проверенная микросхема признана дефектной. Найти вероятность того, что она была исправной.

15. Известно, что в партии из 15 телефонных аппаратов имеется 6 недействующих. Случайным образом из этой партии взято 3 аппарата. Найти закон распределения случайной величины X — числа недействующих аппаратов среди выбранных.

16.	x_i	-3	-1	1	2	5	$A = \{-1 \leq X < 2\}; B = \{X \geq -1\}; C = \{X = 4\}$.
	p_i	0,1	0,2	0,3	0,2	p	

17.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -1, \\ \frac{1}{4}x + \frac{1}{4} & \text{при } -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{5}{8} & \text{при } 1 \leq x < 3, \\ 1 & \text{при } x \geq 3; \end{cases} \quad \text{отрезок } [-1; 2]$$

18. Мастерская изготавливает стержни, длина которых представляет собой случайную величину, распределённую по нормальному закону с математическим ожиданием 25 см и средним квадратическим отклонением 0,1 см. Найти вероятность того, что отклонение длины стержня в ту или другую сторону от математического ожидания: а) не превзойдёт 0,2 см; б) превзойдёт 0,25 см.

19. Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора округляются до ближайшего целого деления. Найти вероятность того, что будет сделана ошибка: а) меньше 0,04; б) больше 0,05.

20. $n = 90$, $k = 8$, $\alpha = 0,05$.

49.52, 16.82, 20.31, 25.87, 12.96, 37.36, 26.10, 49.31, 26.09, 34.83, 16.17, 25.25, 16.45, 40.32, 44.84, 24.03, 37.42, 21.77, 31.23, 43.30, 33.90, 23.41, 21.97, 28.10, 26.91, 24.38, 32.33, 39.70, 26.97, 27.17, 14.99, 10.98, 21.61, 22.70, 36.15, 48.28, 47.43, 28.32, 19.62, 40.56, 40.37, 39.63, 39.75, 14.24, 37.26, 28.53, 18.49, 13.94, 42.94, 17.00, 16.54, 36.64, 45.78, 30.66, 38.11, 16.14, 48.14, 31.64, 37.19, 11.46, 42.37, 39.94, 14.81, 31.00, 23.03, 31.86, 25.96, 26.60, 17.23, 20.22, 10.82, 46.95, 36.15, 47.30, 16.54, 46.84, 41.79, 33.10, 27.60, 20.30, 40.08, 19.15, 12.57, 40.69, 36.85, 38.61, 35.68, 26.76, 25.63, 42.6

Вариант 18.

- $(x^2y + 9y) dy + \sqrt{2 + y^2} dx = 0$
- $xy' + y = x^5, y(1) = 0$
- $(1 + x^2) y'' + 2xy' = 2$
- $y''' + 4y'' - 5y' = 0$
- $y'' - y = 2x, y(0) = 0, y'(0) = 0$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n 3^n}{2^n}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+2} \right)^{2n}$$

$$8. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[5]{\ln n}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{n(n+1)}$$

$$10. \int_0^{0,5} \cos 4x^2 dx$$

$$11. f(x) = \begin{cases} -1, & x \in (-2; 0] \\ 3, & x \in (0; 2) \end{cases}$$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма очков на верхних гранях будет нечётной.

13. В пенале у студентки 10 ручек, из которых 3 синего цвета. Случайным образом студентка достала 5 ручек. Найти вероятность того, что среди вынутых ручек лишь одна синего цвета.

14. Холодильники, поступающие в продажу, изготовлены тремя заводами, причём первый поставляет 30% всего количества, и вероятность того, что они бракованные, равна 0,1, второй — 60% с вероятностью брака 0,2, и третий — 10% с вероятностью брака 0,3. Определить вероятность того, что оказавшийся бракованным холодильник изготовлен на третьем заводе.

15. Из партии контролёр берёт деталь и проверяет её на стандартность. Если деталь оказывается нестандартной, то дальнейшие испытания прекращаются. Если деталь окажется стандартной, то контролёр берёт следующую и так далее, но всего он проверяет не более пяти деталей. Вероятность взятия стандартной детали равна 0,7. Найдите закон распределения случайной величины X , равной числу проверенных деталей.

x_i	-2	-1	0	2	6
p_i	p	0,2	0,1	0,3	0,2

$$A = \{X = 5\}; B = \{X \leq 2\}; C = \{0 \leq X < 6\}.$$

$$17. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -1, \\ \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2} & \text{при } -1 \leq x < 0, \\ \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} & \text{при } 0 \leq x < 3, \\ 1 & \text{при } x \geq 3; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[-\frac{1}{2}; 3\right]$$

18. Производится взвешивание некоторого вещества без систематических погрешностей. Случайные погрешности взвешивания подчинены нормальному закону со средним квадратическим отклонением $\sigma = 20$ г. Найти вероятность того, что взвешивание будет произведено с погрешностью: а) не превосходящей по абсолютной величине 10 г; б) с погрешностью превосходящей по абсолютной величине 20 г.

19. Время в часах задержки вылета самолёта при сбое графика движения

распределено по показательному закону распределения с плотностью:

$$f(t) = \begin{cases} 5e^{-5t} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Определить вероятность того, что: а) время задержки составит менее одного часа; б) время задержки составит более четырёх часов.

20. $n = 70$, $k = 7$, $\alpha = 0, 2$.

7.69, 13.18, 4.70, 22.35, 14.40, 6.19, 16.85, 5.07, 7.81, 2.87, 21.77, 1.89, 37.43, 13.10, 24.50, 5.28, 13.84, 4.22, 9.53, 23.87, 2.07, 22.90, 4.66, 13.26, 20.41, 28.20, 22.13, 7.80, 36.79, 0.11, 10.20, 33.11, 0.77, 16.09, 5.29, 9.79, 0.29, 3.96, 24.23, 16.06, 8.28, 5.96, 9.63, 28.56, 10.25, 2.67, 6.23, 8.03, 4.42, 13.52, 7.22, 2.18, 16.56, 2.80, 11.21, 7.56, 14.30, 5.65, 13.42, 16.39, 22.14, 4.60, 13.62, 1.38, 3.28, 3.84, 3.73, 0.63, 1.97, 8.45

Вариант 19.

$$1. x\sqrt{5+y^2} dx + y\sqrt{4+x^2} dy = 0 \quad 2. y' - y \operatorname{ctg} x = 2x \sin x, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}$$

$$3. x y'' + y' = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad 4. y''' + y'' - 2y' = 0$$

$$5. y'' - 64y = 128 \cos 8x, y(0) = 0, y'(0) = 0$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{n!} \quad 7. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n-3}{3n+1}\right)^n \quad 8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{25}{n^2 \sqrt{n}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n\sqrt{n}} \quad 10. \int_0^{0,5} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx \quad 11. f(x) = x+2, x \in (-1; 1)$$

12. На пяти одинаковых карточках написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5. Две карточки вынимаются одна за другой. Найти вероятность того, что число на второй карточке будет меньше, чем на первой, если первая карточка после вынимания кладётся обратно и смешивается с остальными.

13. Из 50 вопросов экзамена студент подготовил 40. Найти вероятность того, что из двух заданных ему вопросов студент знает ровно один.

14. В первом ящике находятся 3 белых и 4 чёрных шара; во втором — 2 белых и 3 чёрных шара; в третьем — неизвестное количество шаров, причём все они белые. Из наугад взятого ящика вынули наугад один шар. 1) Найти вероятность следующего события A : выбранный шар — белый. 2) Вынули белый шар. Найти вероятность того, что его вынули из третьего ящика.

15. Производится пять независимых опытов Бернулли, причём вероятность успеха в каждом опыте равна 0,5. Случайная величина X — число успехов в

пяти опытах. Составьте закон распределения случайной величины X .

16.	x_i	-5	-3	-2	1	5	$A = \{-5 \leq X < 1\}; B = \{X = 4\}; C = \{X \geq 1\}$.
	p_i	0,2	p	0,1	0,2	0,3	

17.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 1, \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} & \text{при } 1 \leq x < 2, \\ \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{5}{2} & \text{при } 2 \leq x < 3, \\ 1 & \text{при } x \geq 3; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]$$

18. Срок безотказной работы телевизора представляет собой случайную величину X , распределённую нормально с математическим ожиданием 12 лет и средним квадратическим отклонением 3 года. Найти вероятность того, что телевизор проработает: а) не менее 15 лет; б) от 6 до 9 лет; в) от 9 до 15 лет.

19. Автобусы некоторого маршрута идут строго по расписанию. Интервал движения 5 минут. Найти вероятность того, что пассажир, подошедший к остановке, будет ожидать очередной автобус: а) менее 3 минут; б) более 4 минут. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины, равной времени ожидания автобуса.

20. $n = 80, k = 7, \alpha = 0,01$.

7.67, 13.24, 16.04, 11.57, 10.14, 9.25, 10.85, 19.00, 7.73, 14.46, 16.49, 11.40, 11.49, 2.12, 11.99, 6.40, 8.41, 11.31, 11.82, 4.96, 7.32, 7.15, 11.39, 13.57, 9.37, 8.00, 11.96, 8.96, 8.57, 10.10, 12.10, 9.25, 15.22, 5.27, 10.68, 10.35, 7.31, 9.34, 6.61, 9.09, 4.80, 9.87, 14.62, 9.25, 5.89, 9.42, 5.70, 9.26, 6.03, 10.04, 4.14, 8.04, 9.63, 10.30, 11.65, 7.33, 8.08, 7.35, 11.99, 14.95, 11.27, 10.96, 6.73, 10.77, 12.98, 9.81, 15.21, 8.02, 7.98, 12.43, 11.61, 8.66, 11.29, 13.85, 13.11, 8.90, 10.10, 8.56, 10.53, 14.51

Вариант 20.

1. $6x dx - y dy = y x^2 dy - 3x y^2 dx$ 2. $y' - \frac{y}{x} = x^2, y(1) = 0$

3. $x^4 y'' + x^3 y' = 1$ 4. $y''' + 6y'' + 5y' = 0$

5. $y'' + 3y' + 2y = 1 - 2x^2, y(0) = 0, y'(0) = 0$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n^n}$

8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^6 n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{n}}$

10. $\int_0^{0,2} \sin 5x^2 dx$

11. $f(x) = \begin{cases} 5, & x \in (-\pi; 0] \\ -1, & x \in (0; \pi) \end{cases}$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность, что сумма выпавших очков не превосходит 5.

13. Имеется 6 деталей первого сорта и 5 деталей второго сорта. Какова вероятность того, что среди 4 случайно выбранных деталей, деталей первого и второго сортов окажется поровну?

14. Пассажир приобретает билет в одной из двух касс. Вероятность его обращения в первую кассу равна 0,4, а во вторую — 0,6. Вероятность того, что к моменту прихода пассажира все билеты будут распроданы, равна 0,35 для первой кассы и 0,7 — для второй. Пассажир приобрёл билет. В какой кассе он его купил вероятнее всего?

15. Производятся последовательные испытания пяти приборов на надёжность. Каждый следующий прибор испытывается только в том случае, если предыдущий оказался надёжным. Вероятность выдержать испытание для каждого прибора равна 0,8. Составьте таблицу распределения случайной величины X , равной числу испытанных приборов.

16.

x_i	-4	-2	-1	2	3
p_i	0,2	0,3	p	0,3	0,1

 $A = \{X \leq 2\}$; $B = \{-4 \leq X < 2\}$; $C = \{X = 1\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -1, \\ \frac{3}{16}x^2 + \frac{3}{8}x + \frac{3}{16} & \text{при } -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} & \text{при } 1 \leq x < 2, \\ 1 & \text{при } x \geq 2; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[-\frac{1}{2}; 1\right]$$

18. Деталь, изготовленная автоматом, считается годной, если отклонение X контролируемого размера от номинала не превосходит 10 мм. Точность изготовления деталей характеризуется средним квадратическим отклонением σ . Считая, что для данной технологии $\sigma = 5$ мм и X нормально распределена, выяснить: а) сколько процентов годных деталей изготавливает автомат; б) какой должна быть точность изготовления деталей при изменении технологии, чтобы автомат изготавливал 95% годных деталей?

19. Минутная стрелка электрических часов перемещается скачком в конце каждой минуты. Найти вероятность того, что в данное мгновение часы покажут время, которое отличается от истинного не более чем на 20 секунд. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины, равной разности между точным временем и показанием часов.

20. $n = 90$, $k = 9$, $\alpha = 0,01$.

-18.86, -35.29, -10.07, -16.45, -5.20, -5.01, -8.07, -38.32, -36.56, -24.02, -13.46, -7.28, -19.62, 1.00, -4.08, 8.43, -13.43, -23.74, -34.72, -9.45, -1.06, -18.83, -35.46, -26.68, -32.32, -25.95, -18.00, -13.64, -17.13, 3.77, -14.10, 7.18, -8.11, 7.88, -27.96, -6.19, -25.55, -6.41, -5.24, -36.60,

−27.26, −28.80, −6.61, 2.22, −22.78, −0.97, −6.23, −39.66, −9.89, −20.66, 5.80, −39.94, −16.88, −18.78, −16.95, −1.49, −23.88, −0.76, −16.43, −38.21, −31.21, −3.91, −16.33, −32.36, −22.94, −9.63, −30.41, −3.08, −27.86, 5.87, −26.55, −1.72, −30.57, −25.63, −35.44, −11.19, −5.83, −12.67, −18.71, −7.78, −7.62, −6.05, −8.21, 7.26, −29.55, −4.54, −28.19, −34.03, −9.63, −17.49

Вариант 21.

1. $(2 - e^x) dy + 3e^x \operatorname{tg} y dx = 0$ 2. $y' - y \operatorname{tg} x = 1, y(0) = 0$

3. $y'' x \ln x = y'$ 4. $y''' + 6y'' + 9y' = 0$

5. $y'' + 6y' + 5y = 84 e^{2x}, y(0) = -1, y'(0) = 1$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\sqrt{2^n}}$ 7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^3 + 1}{4n^3 + 2n} \right)^{2n}$ 8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}$ 10. $\int_0^{0,5} \sqrt{1+x^4} dx$ 11. $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-1; 0] \\ x, & x \in (0; 1) \end{cases}$

12. В барабане револьвера шесть гнёзд, из них в четырёх заложены патроны, а два оставлены пустыми. Барабан приводится во вращение, в результате чего против ствола случайным образом оказывается одно из гнёзд. После этого нажимается спусковой крючок. Если гнездо было пустым, то выстрел не происходит. Найти вероятность того, что повторив такой опыт два раза подряд, мы оба раза выстрелим.

13. В ящике 10 красных и 5 синих пуговиц. Вынимаются наудачу четыре пуговицы. Какова вероятность, что будет вынуто поровну красных и синих пуговиц?

14. Три экзаменатора принимают экзамен по некоторому предмету у группы в 30 человек, причём первый опрашивает 6 студентов, второй — 3 студентов, а третий — 21 студента (выбор студентов производится случайным образом из списка). Отношение трёх экзаменаторов к слабо подготовившимся различное: шансы таких студентов сдать экзамен у первого преподавателя равны 40%, у второго — только 10%, у третьего — 70%. 1) Найти вероятность того, что слабо подготовившийся студент сдаст экзамен. 2) Пусть известно, что студент не сдал экзамен. Кому из трёх преподавателей вероятнее всего он отвечал?

15. Баскетболист забрасывают мяч в корзину до первого попадания. Найти закон распределения случайного числа бросков, если вероятность попадания равна 0,7, а число бросков не превосходит 5.

16.

x_i	-5	-3	1	2	4
p_i	p	0,2	0,1	0,3	0,1

 $A = \{X = 3\}; B = \{X < 1\}; C = \{-3 < X \leq 4\}.$

$$17. \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -2, \\ \frac{1}{6}x + \frac{1}{3} & \text{при } -2 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}x^2 - x + 1 & \text{при } 1 \leq x < 2, \\ 1 & \text{при } x \geq 2; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[-1; \frac{3}{2}\right]$$

18. Масса вагона — случайная величина, распределённая по нормальному закону с математическим ожиданием 65 тонн и средним квадратическим отклонением $\sigma = 0,2$ тонн. Найти вероятность того, что очередной вагон имеет массу: а) не более 70 тонн, но не менее 60 тонн; б) более 68 тонн.

19. Время T расформирования состава — случайная величина, распределённая по показательному закону. Среднее число поездов, которые могут быть расформированы за один час, равно 5. Определить вероятность того, что время расформирования состава составит а) более 0,3 часа; б) менее 0,5 часа.

20. $n = 100$, $k = 8$, $\alpha = 0,02$.

4.80, 10.84, 9.97, 33.73, 5.30, 16.83, 3.32, 4.03, 7.80, 7.91, 19.79, 18.28, 5.11, 0.67, 4.71, 7.34, 11.56, 9.62, 5.81, 2.76, 0.48, 7.26, 10.36, 15.37, 5.71, 3.84, 4.48, 17.13, 26.56, 2.84, 18.38, 34.02, 6.95, 8.73, 2.02, 7.75, 0.55, 8.89, 6.87, 15.24, 10.54, 5.88, 16.55, 0.51, 23.29, 8.06, 2.12, 4.25, 1.70, 20.29, 1.38, 14.98, 12.11, 22.92, 9.52, 20.56, 9.36, 12.56, 0.08, 6.96, 4.04, 8.09, 47.13, 4.71, 4.41, 0.13, 3.89, 4.23, 0.33, 9.23, 17.66, 6.90, 14.89, 2.78, 9.91, 23.55, 0.73, 23.70, 2.21, 8.69, 8.14, 38.66, 11.97, 2.48, 1.71, 10.71, 0.45, 9.28, 2.37, 17.88, 19.34, 4.58, 5.13, 1.89, 0.39, 4.70, 13.70, 12.88, 0.18, 14.65

Вариант 22.

$$1. \quad y' = (2y + 1) \operatorname{ctg} x \qquad 2. \quad y' - \frac{3y}{x} = x, \quad y(1) = 6$$

$$3. \quad y'' - \frac{y'}{x(2 + \ln x)} = 2 + \ln x \qquad 4. \quad y''' + y' = 0$$

$$5. \quad y'' - y' = 2x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

$$6. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n! 4^n} \qquad 7. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{3n-1} \right)^n \qquad 8. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$$

$$9. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2^n} \qquad 10. \quad \int_0^1 \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2} dx \qquad 11. \quad f(x) = |x|, \quad x \in (-1; 1)$$

12. Найти вероятность того, что на кости, наудачу извлечённой из полного набора домино, оба числа нечётные.

13. В партии деталей, состоящей из 18 изделий имеется 12 окрашенных, а остальные не окрашены. Какова вероятность того, что из 10 взятых наудачу

изделий будет ровно 6 окрашенных?

14. Фирма имеет три источника поставки комплектующих — фирмы A , B , C . На долю фирмы A приходится 50% общего объёма поставок, на долю фирмы B — 30% и на долю фирмы C — 30%. Из практики известно, что среди поставляемых фирмой A деталей 10% бракованных, фирмой B — 5% и фирмой C — 6%. 1) Какова вероятность, что взятая наугад деталь окажется годной? 2) Пусть известно, что деталь оказалась годной. С какой из трёх фирм вероятнее всего поставлена эта деталь?

15. Производятся последовательные независимые испытания пяти самолётов. Вероятность каждого самолёта пройти испытание равна 0,9. Испытание заканчивается после первого самолёта, не выдержавшего испытания. Составить закон распределения числа испытаний самолётов.

16.

x_i	-3	-1	0	1	3
p_i	0,1	0,4	p	0,2	0,1

 $A = \{X = -2\}$; $B = \{-1 \leq X < 1\}$; $C = \{X \leq 0\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -2, \\ \frac{1}{4}x^2 + x + 1 & \text{при } -2 \leq x < -1, \\ \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} & \text{при } -1 \leq x < 2, \\ 1 & \text{при } x \geq 2; \end{cases} \quad \text{отрезок } [-3; 0]$$

18. Стрельба ведётся из точки O вдоль прямой Ox . Средняя дальность полёта равна m . Предполагая, что дальность полёта X распределена по нормальному закону со средним квадратическим отклонением $\sigma = 80$ метров, найти, какой процент выпускаемых снарядов даст перелёт от 120 до 160 метров.

19. Шкала рычажных весов, установленных в лаборатории, имеет цену деления 1 грамм. При измерении массы химических компонентов смеси отсчёт делается с точностью до целого деления с округлением в ближайшую сторону. Считается, что абсолютная ошибка определения массы равномерно распределена в интервале от 0 г до 0,5 г. Какова вероятность, что абсолютная ошибка определения массы: а) не превысит величины среднего квадратического отклонения σ возможных ошибок измерения массы; б) будет заключена между значениями σ и 2σ ?

20. $n = 70$, $k = 8$, $\alpha = 0,01$.

42.97, 4.57, 6.20, 12.35, 10.23, 61.93, 20.69, 22.09, 1.48, 10.29, 11.39, 4.28, 13.79, 5.03, 2.35, 4.96, 1.25, 14.04, 1.56, 8.46, 26.28, 31.13, 1.98, 0.20, 6.57, 2.17, 41.29, 5.44, 3.06, 67.15, 20.48, 11.41, 35.63, 15.09, 1.49, 9.67, 7.21, 1.83, 4.82, 7.05, 14.52, 8.61, 14.43, 29.76, 23.02, 27.40, 16.78, 11.51, 30.30, 4.80, 14.36, 6.22, 3.01, 9.36, 39.95, 4.24, 2.09, 48.76, 6.92, 20.45, 27.17, 1.08, 15.80, 13.62, 1.58,

8.08, 2.43, 15.57, 4.00, 6.23

Вариант 23.

1. $\sqrt{3+y^2} + \sqrt{1-x^2} y y' = 0$

2. $y' - \frac{y}{x} = \ln x, y(1) = 0$

3. $x^5 y'' + x^4 y' = 1$

4. $y''' - 3y'' + 2y' = 0$

5. $y'' - 2y' = e^x (3x - 1), y(0) = 2, y'(0) = 0$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (n+1)}{n!}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 + 1}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$

10. $\int_0^1 \frac{1}{x} \sin \frac{x}{4} dx$

11. $f(x) = x - 2, x \in (-3; 3)$

12. Все грани куба раскрасили следующим образом: каждые две противоположные грани — одного цвета: белого, серого или чёрного; любые две грани, имеющие общее ребро, — разных цветов. Затем кубик распилили на 216 одинаковых кубиков и тщательно перемешали. Найти вероятность того, что наудачу извлечённый кубик имеет хотя бы одну окрашенную грань.

13. В подразделении 12 пилотов, из них 5 пилотов первого класса. Для проверки лётных навыков наугад выбирают 6 человек. Какова вероятность того, что среди выбранных пилотов ровно два имеют первый класс?

14. В часовой магазин поступают часы с трёх фабрик, причём с первой фабрики поступает 40% часов, со второй — 35%, а с третьей 25%. Вероятность брака на первой фабрике равна 0,06, на второй — 0,07, на третьей — 0,08.

1) Какова вероятность того, что случайно выбранные часы оказались бракованными? 2) Выбранные часы оказались бракованными. Какова вероятность того, что эти часы со второй фабрики?

15. В лотерее 900 билетов. Из них на 5 билетов выпадает выигрыш в 100000 руб., на 90 по 50000 руб., на 150 по 10000 руб. Остальные билеты невыигрышные. Случайной величиной X является сумма выигрыша для человека, имеющего один билет. Найти закон распределения случайной величиной X .

16.

x_i	-6	-3	2	3	4
p_i	0,3	p	0,2	0,1	0,3

$$A = \{-3 \leq X < 4\}; B = \{X < 3\}; C = \{X = 6\}.$$

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 2, \\ \frac{1}{8}x - \frac{1}{4} & \text{при } 2 \leq x < 4, \\ \frac{3}{16}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{13}{4} & \text{при } 4 \leq x < 6, \\ 1 & \text{при } x \geq 6; \end{cases} \quad \text{отрезок } [3; 5]$$

18. В нормально распределённой совокупности 15% значений x меньше 12 и

40% значений x больше 16, 2. Найти среднее значение и среднеквадратическое отклонение данного распределения.

19. Время в годах безотказной работы прибора подчинено показательному закону распределения с плотностью:

$$f(t) = \begin{cases} 2e^{-2t} & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$$

Определить вероятность того, что: а) прибор проработает не более года; б) прибор безотказно проработает 3 года.

20. $n = 80$, $k = 9$, $\alpha = 0,01$.

5.72, 5.88, 1.42, 3.66, 7.14, 7.86, 5.77, 5.89, 6.99, 3.34, 4.01, 7.82, 5.35, 7.00, 6.42, 5.09, 5.09, 7.91, 7.13, 4.59, 5.04, 4.97, 4.81, 2.68, 7.34, 2.69, 5.44, 1.61, 7.62, 4.36, 9.76, 4.65, 5.57, 5.17, 4.98, 3.40, 6.34, 2.35, 7.47, 5.49, 5.15, 1.05, 6.87, 6.20, 5.18, 6.47, 3.98, 2.34, 1.75, 5.71, 6.26, 5.39, 4.29, 3.95, 4.46, 4.92, 3.05, 5.93, 6.80, 3.91, 1.49, 7.05, 4.31, 6.66, 6.65, 3.37, 3.44, 5.07, 7.71, 5.28, 3.64, 3.99, 6.76, 2.07, 4.16, 1.31, 2.93, 4.39, 6.45, 3.29

Вариант 24.

1. $x\sqrt{1-y^2} dx + y\sqrt{1-x^2} dy = 0$ 2. $y' + y \cos x = \cos x e^{-\sin x}$, $y(0) = 1$

3. $xy'' + y' = 3x + 2$

4. $y'''' - 16y = 0$

5. $y'' - 4y' + 3y = 10 \cos x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{10^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{4n+3}\right)^{2n}$

8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{\ln n}}{n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n!}$

10. $\int_0^{0,2} e^{-3x^2} dx$

11. $f(x) = 3 - x$, $x \in (-2; 2)$

12. В коробке лежат девять карточек, на которых написаны цифры от 1 до 9. Вынимают две карточки. Найти вероятность, что произведение чисел больше 30.

13. В зоомагазине 7 волнистых попугайчиков зелёного цвета и 5 белого. Было куплено 4 попугая. Найти вероятность, что среди купленных попугайчиков было ровно два зелёных.

14. Детали, изготавливаемые цехом завода, попадают для проверки на стандартность к одному из двух контролёров. Вероятность того, что деталь попадёт к первому контролёру, равна 0,6, а ко второму — 0,4. Вероятность того, что годная деталь признана стандартной первым контролёром равна 0,94, а вторым — 0,98. 1) Найти вероятность того, что случайно выбранная де-

таль была признана годной. 2) Годная деталь была признана годной. Найти вероятность того, что эту деталь проверял первый контролёр.

15. С подводной лодки выпускаются торпеды последовательно до первого попадания в цель или полного израсходования всего боекомплекта, состоящего из 6 торпед. Все выстрелы независимые, а вероятность попадания в цель каждой торпеды 0,2. Случайная величина X — число израсходованных торпед. Найти закон распределения случайной величины X .

16.

x_i	-2	-1	0	2	4
p_i	0,2	0,1	0,4	0,2	p

 $A = \{X \geq -1\}$; $B = \{X = 3\}$; $C = \{-1 < X \leq 2\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -4, \\ \frac{1}{4}x + 1 & \text{при } -4 \leq x < -2, \\ \frac{1}{2} & \text{при } -2 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}x & \text{при } 1 \leq x < 2, \\ 1 & \text{при } x \geq 2; \end{cases} \quad \text{отрезок } [-3; 1]$$

18. Химический завод изготавливает серную кислоту номинальной плотностью 1,84 г/см³. В результате статистических испытаний обнаружено, что практически 99,9% всех выпускаемых реактивов имеют плотность в интервале (1,82; 1,86). Найти вероятность того, что кислота удовлетворяет стандарту, если для этого достаточно, чтобы её плотность не отклонялась от номинала более, чем на 0,01 г/см³. Считать, что плотность распределена по нормальному закону.

19. Число самолётов, подлетающих к аэродрому, распределено по показательному закону с математическим ожиданием 30 самолётов в час. Найти вероятность того, что за час к аэродрому подлетит: а) более 20 самолётов; б) менее 30 самолётов; в) ровно 40 самолётов.

20. $n = 90$, $k = 8$, $\alpha = 0,02$.

39.65, 3.28, 19.98, 17.24, 52.82, 11.59, 21.08, 29.33, 7.36, 7.75, 11.33, 23.04, 3.43, 14.46, 47.70, 16.58, 0.08, 72.13, 0.42, 3.15, 45.56, 23.55, 2.58, 1.81, 12.97, 4.19, 38.53, 29.49, 43.94, 32.93, 16.08, 7.26, 36.55, 10.62, 7.28, 18.83, 31.58, 28.16, 12.27, 25.94, 20.63, 5.28, 9.48, 21.62, 9.71, 21.01, 5.49, 3.23, 84.68, 26.82, 78.22, 21.01, 34.23, 8.81, 45.10, 3.58, 9.88, 1.67, 39.27, 29.18, 8.95, 34.80, 2.10, 2.07, 43.18, 2.92, 8.20, 39.81, 7.53, 31.01, 16.21, 4.10, 0.62, 45.90, 29.94, 1.92, 6.36, 11.36, 4.64, 2.63, 5.34, 7.54, 29.95, 3.80, 0.81, 5.59, 12.64, 3.78, 5.07, 38.84

Вариант 25.

1. $y(5 + \ln y) + xy' = 0$

2. $y' - y \cos x = \cos^2 x e^{\sin x}$, $y(0) = 0$

3. $x^4 y'' + x^3 y' = 4$

4. $y'''' - 9y'' = 0$

5. $y'' + 4y = e^{-2x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n^2}{10^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{3n}$

8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5}{n\sqrt{n}}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$

10. $\int_0^{0,3} e^{-2x^2} dx$

11. $f(x) = 3x - 1$, $x \in (-4; 4)$

12. Брошены две игральные кости. Найти вероятность, что выпавшие числа отличаются на 2.

13. В подразделении 12 пилотов, из них пять пилотов первого класса, четыре пилота второго класса и три пилота третьего класса. Для проверки лётных навыков наугад выбирают 8 пилотов. Какова вероятность того, что среди выбранных пилотов окажутся три пилота первого класса, три пилота второго класса и два пилота третьего класса?

14. В пирамиде установлены 5 винтовок, из которых 3 снабжены оптическим прицелом. Вероятность попасть цель из винтовки с оптическим прицелом равна 0,95, а для винтовки без прицела — 0,7. 1) Найти вероятность того, что мишень будет поражена, если стрелок произведёт один выстрел из наудачу взятой винтовки. 2) Известно, что цель поражена. Найти вероятность, что она поражена из винтовки без прицела.

15. Человек, имея 6 ключей, хочет открыть дверь. При этом он подбирает ключи случайно, зная, что только один ключ подходит к замку. Составить закон распределения числа испытаний при условии, что испробованный ключ далее не используется.

16.

x_i	-1	0	1	3	5
p_i	0,2	0,1	0,2	p	0,1

 $A = \{0 \leq X < 3\}$; $B = \{X = 2\}$; $C = \{X \geq 1\}$.

17.
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 3, \\ \frac{3}{4}x - \frac{9}{4} & \text{при } 3 \leq x < 4, \\ x^2 - 8x + \frac{67}{4} & \text{при } 4 \leq x < \frac{9}{2}, \\ 1 & \text{при } x \geq \frac{9}{2}; \end{cases} \quad \text{отрезок } \left[\frac{7}{2}; 4\right]$$

18. Распределение рабочих по выполнению нормы выработки подчинено закону нормального распределения со средней арифметической 110% и средним квадратическим отклонением 2%. Определить вероятность того, что выполнение нормы выработки одного из наудачу взятых рабочих окажется: а) от

107 до 108%; б) от 105 до 115%.

19. Время ожидания ответа на звонок в компанию по предоставлению интернет услуг распределено по показательному закону. Среднее время ожидания составляет 7 минут. Найти вероятность того, что время ожидания: а) составит менее четырёх минут; б) составит более десяти минут.

20. $n = 70$, $k = 8$, $\alpha = 0,3$.

−0.95, 28.87, 27.34, 31.14, 10.34, 18.14, 37.05, 6.64, −16.40, 32.00, 17.87, 1.30, 39.82, −6.55, 19.15, 16.30, 3.23, −11.47, −18.49, 5.27, −8.95, 23.55, 2.22, 30.49, 24.05, 14.26, −9.39, 37.44, −4.08, 35.47, −6.57, 2.41, −14.75, 18.41, −9.16, −17.30, 23.39, 0.85, 19.64, 3.03, 17.64, −18.70, 34.63, 28.03, 24.75, 28.79, 3.00, 17.04, 14.53, 11.80, −3.50, −5.08, 7.10, −6.34, 28.27, 39.17, −18.20, 12.14, −14.78, 28.13, 39.35, −15.98, 36.36, −18.91, 21.03, 27.02, 12.05, 33.12, 33.94, 17.56

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1.

Таблица разложений функций в ряд Тейлора

$$\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad |x| < \infty, \\
\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, \\
& \hspace{25em} |x| < \infty, \\
\cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots, \quad |x| < \infty, \\
\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots, \\
& \hspace{25em} -1 < x \leq 1, \\
\ln(1-x) &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} - \dots, \quad -1 \leq x < 1, \\
\frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + \dots, \quad |x| < 1, \\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots, \quad |x| < 1, \\
(1+x)^m &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)}{n!} x^n = \\
&= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} x^3 + \dots \\
&\dots + \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)}{n!} x^n + \dots, \quad m \in \mathbb{R}, \quad |x| < 1.
\end{aligned}$$

Приложение 2.

Таблица значений функции $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ нормированного нормального распределения										
x	сотые доли аргумента x									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	0,3989	0,3989	0,3988	0,3986	0,3984	0,3982	0,3980	0,3977	0,3973
0,1	0,3970	0,3965	0,3961	0,3956	0,3951	0,3945	0,3939	0,3932	0,3925	0,3918
0,2	0,3910	0,3902	0,3894	0,3885	0,3876	0,3867	0,3857	0,3847	0,3836	0,3825
0,3	0,3814	0,3802	0,3790	0,3778	0,3765	0,3752	0,3739	0,3725	0,3712	0,3697
0,4	0,3683	0,3668	0,3653	0,3637	0,3621	0,3605	0,3589	0,3572	0,3555	0,3538
0,5	0,3521	0,3503	0,3485	0,3467	0,3448	0,3429	0,3410	0,3391	0,3372	0,3352
0,6	0,3332	0,3312	0,3292	0,3271	0,3251	0,3230	0,3209	0,3187	0,3166	0,3144
0,7	0,3123	0,3101	0,3079	0,3056	0,3034	0,3011	0,2989	0,2966	0,2943	0,2920
0,8	0,2897	0,2874	0,2850	0,2827	0,2803	0,2780	0,2756	0,2732	0,2709	0,2685
0,9	0,2661	0,2637	0,2613	0,2589	0,2565	0,2541	0,2516	0,2492	0,2468	0,2444
1,0	0,2420	0,2396	0,2371	0,2347	0,2323	0,2299	0,2275	0,2251	0,2227	0,2203
1,1	0,2179	0,2155	0,2131	0,2107	0,2083	0,2059	0,2036	0,2012	0,1989	0,1965
1,2	0,1942	0,1919	0,1895	0,1872	0,1849	0,1826	0,1804	0,1781	0,1758	0,1736
1,3	0,1714	0,1691	0,1669	0,1647	0,1626	0,1604	0,1582	0,1561	0,1539	0,1518
1,4	0,1497	0,1476	0,1456	0,1435	0,1415	0,1394	0,1374	0,1354	0,1334	0,1315
1,5	0,1295	0,1276	0,1257	0,1238	0,1219	0,1200	0,1182	0,1163	0,1145	0,1127
1,6	0,1109	0,1092	0,1074	0,1057	0,1040	0,1023	0,1006	0,0989	0,0973	0,0957
1,7	0,0940	0,0925	0,0909	0,0893	0,0878	0,0863	0,0848	0,0833	0,0818	0,0804
1,8	0,0790	0,0775	0,0761	0,0748	0,0734	0,0721	0,0707	0,0694	0,0681	0,0669
1,9	0,0656	0,0644	0,0632	0,0620	0,0608	0,0596	0,0584	0,0573	0,0562	0,0551
2,0	0,0540	0,0529	0,0519	0,0508	0,0498	0,0488	0,0478	0,0468	0,0459	0,0449
2,1	0,0440	0,0431	0,0422	0,0413	0,0404	0,0396	0,0387	0,0379	0,0371	0,0363
2,2	0,0355	0,0347	0,0339	0,0332	0,0325	0,0317	0,0310	0,0303	0,0297	0,0290
2,3	0,0283	0,0277	0,0270	0,0264	0,0258	0,0252	0,0246	0,0241	0,0235	0,0229
2,4	0,0224	0,0219	0,0213	0,0208	0,0203	0,0198	0,0194	0,0189	0,0184	0,0180
2,5	0,0175	0,0171	0,0167	0,0163	0,0158	0,0154	0,0151	0,0147	0,0143	0,0139

**Таблица значений функции $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$
нормированного нормального распределения**

x	сотые доли аргумента x									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,6	0,0136	0,0132	0,0129	0,0126	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110	0,0107
2,7	0,0104	0,0101	0,0099	0,0096	0,0093	0,0091	0,0088	0,0086	0,0084	0,0081
2,8	0,0079	0,0077	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0067	0,0065	0,0063	0,0061
2,9	0,0060	0,0058	0,0056	0,0055	0,0053	0,0051	0,0050	0,0048	0,0047	0,0046
3,0	0,0044	0,0043	0,0042	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036	0,0035	0,0034
3,1	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026	0,0025	0,0025
3,2	0,0024	0,0023	0,0022	0,0022	0,0021	0,0020	0,0020	0,0019	0,0018	0,0018
3,3	0,0017	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014	0,0013	0,0013
3,4	0,0012	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0009
3,5	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006
3,6	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004
3,7	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
3,8	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
3,9	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001

При $x \geq 4$ полагают $\varphi(x) = 0$.

При отрицательных значениях x используется формула $\varphi(-x) = \varphi(x)$.

Таблица значений										
функции Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$										
x	сотые доли аргумента x									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4485	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4924	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986

Таблица значений						
функции Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$						
x	сотые доли аргумента x					
	0	2	4	5	6	8
3,0	0,498650	0,498736	0,498817	0,498856	0,498893	0,498965
3,1	0,499032	0,499096	0,499155	0,499184	0,499211	0,499264
3,2	0,499313	0,499359	0,499402	0,499423	0,499443	0,499481
3,3	0,499517	0,499550	0,499581	0,499596	0,499610	0,499638
3,4	0,499663	0,499687	0,499709	0,499720	0,499730	0,499749
3,5	0,499767	0,499784	0,499800	0,499807	0,499815	0,499828
3,6	0,499841	0,499853	0,499864	0,499869	0,499874	0,499883
3,7	0,499892	0,499900	0,499908	0,499912	0,499915	0,499922
3,8	0,499928	0,499933	0,499938	0,499941	0,499943	0,499948
3,9	0,499952	0,499956	0,499959	0,499961	0,499963	0,499966
4,0	0,499968	0,499971	0,499973	0,499974	0,499975	0,499977
4,1	0,499979	0,499981	0,499983	0,499983	0,499984	0,499985
4,2	0,499987	0,499988	0,499989	0,499989	0,499990	0,499991
4,3	0,499991	0,499992	0,499993	0,499993	0,499993	0,499994
4,4	0,499995	0,499995	0,499996	0,499996	0,499996	0,499996
4,5	0,499997	0,499997	0,499997	0,499997	0,499997	0,499998
4,6	0,499998	0,499998	0,499998	0,499998	0,499998	0,499999
4,7	0,499999	0,499999	0,499999	0,499999	0,499999	0,499999
4,8	0,499999	0,499999	0,499999	0,499999	0,499999	0,499999
4,9	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000

При $x \geq 5$ полагают $\Phi(x) = 0,5$.

При отрицательных значениях x используется формула $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

Приложение 4.

Таблица значений функции χ^2							
число степеней свободы	уровень значимости α						
	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,001
1	1,074	1,642	2,71	3,84	5,41	6,64	10,83
2	2,41	3,22	4,60	5,99	7,82	9,21	13,82
3	3,66	4,64	6,25	7,82	9,84	11,34	16,27
4	4,88	5,99	7,78	9,49	11,67	13,28	18,46
5	6,06	7,29	9,24	11,07	13,39	15,09	20,5
6	7,23	8,56	10,64	12,59	15,03	16,81	22,5
7	8,38	9,80	12,02	14,07	16,62	18,48	24,3
8	9,52	11,03	13,36	15,51	18,17	20,1	26,1
9	10,66	12,24	14,68	16,92	19,68	21,7	27,9
10	11,78	13,44	15,99	18,31	21,2	23,2	29,6
11	12,90	14,63	17,28	19,68	22,6	24,7	31,3
12	14,01	15,81	18,55	21,0	24,1	26,2	32,9
13	15,12	16,98	19,81	22,4	25,5	27,7	34,6
14	16,22	18,15	21,1	23,7	26,9	29,1	36,1
15	17,32	19,31	22,3	25,0	28,3	30,6	37,7
16	18,42	20,5	23,5	26,3	29,6	32,0	39,3
17	19,51	21,6	24,8	27,6	31,0	33,4	40,8
18	20,6	22,8	26,0	28,9	32,3	34,8	42,3
19	21,7	23,9	27,2	30,1	33,7	36,2	43,8
20	22,8	25,0	28,4	31,4	35,0	37,6	45,3
21	23,9	26,2	29,6	32,7	36,3	38,9	46,8
22	24,9	27,3	30,8	33,9	37,7	40,3	48,3
23	26,0	28,4	32,0	35,2	39,0	41,6	49,7
24	27,1	29,6	33,2	36,4	40,3	43,0	51,2
25	28,2	30,7	34,4	37,7	41,7	44,3	52,6
26	29,2	31,8	35,6	38,9	42,9	45,6	54,1
27	30,3	32,9	36,7	40,1	44,1	47,0	55,5
28	31,4	34,0	37,9	41,3	45,4	48,3	56,9
29	32,5	35,1	39,1	42,6	46,7	49,6	58,3
30	33,5	36,2	40,3	43,8	48,0	50,9	59,7

Рекомендуемая литература

1. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. Любое издание.
2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Любое издание.
3. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. Полный курс. Любое издание.
4. Шипачёв В. С. Высшая математика. Учебное пособие для бакалавров. Любое издание.
5. Шипачёв В. С. Начала высшей математики. Любое издание.

Содержание

Контрольные домашние задания	3
Приложения	41
Приложение 1. Таблица разложений функций в ряд Тейлора	41
Приложение 2. Таблица значений функции $\varphi(x)$	42
Приложение 3. Таблица значений функции Лапласа $\Phi(x)$	44
Приложение 4. Таблица значений функции χ^2	46
Рекомендуемая литература	47